

Programa de
detección precoz
de cáncer de
cuello de útero

CÁNCER DE CÉR- VIX

Detectarlo a tiempo marca la diferencia.



Osakidetza


Euskadi, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO O CÁNCER DE CÉRVIX



Es el cáncer que afecta a una zona genital femenina: el cuello del útero, la parte del útero que conecta con la vagina.

Generalmente este tipo de cáncer tarda más de 10 años en desarrollarse, por lo que se dispone de un plazo prolongado para detectarlo, tratarlo y curarlo.

El programa de detección precoz del cáncer de cérvix es muy efectivo para poder detectar la enfermedad, controlar su desarrollo y tratar las lesiones precursoras, disminuyendo así las probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer.

La causa principal es el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se transmite fácilmente a través de las relaciones sexuales.

Incluso no es necesario una relación sexual coital para poder contagiarse.

El VPH es una infección muy frecuente, que la mayoría de las veces desaparece por sí sola. Solo en un pequeño porcentaje de casos en que la infección se mantiene en el tiempo, se pueden producir cambios en las células del cuello uterino que derivan en el desarrollo de lesiones premalignas y que podrían evolucionar a un cáncer.

Las pruebas de detección precoz (citología y prueba del VPH), ayudan a prevenir la enfermedad.

Además, **la vacuna contra el VPH protege de forma eficaz frente a los principales tipos de VPH** que causan cáncer de cérvix.

El uso del preservativo reduce notablemente las posibilidades de transmisión del virus, pero hay que recordar que el contacto de genitales o sexo oral es suficiente para poder contagiarse.

¿Cómo participo en el programa?

Por medio de una carta-invitación con una cita para acudir a la consulta de su matrona.

Se trata de una **cita asignada** para la realización de la prueba de detección de cáncer de cuello uterino, o cribado de cérvix.

¿En qué consiste la prueba?

La prueba del cribado de cérvix es un procedimiento sencillo y fácil, se tarda menos de cinco minutos y suele ser indoloro.

La matrona recogerá mediante un espéculo una toma de muestra del cuello del útero y la enviará al laboratorio para su estudio. Una vez allí se procederá a su preparación para una citología o para determinación del VPH.

Para asistir a la prueba es necesario tener en cuenta que no se debe realizar durante la menstruación, y que no se deben utilizar medicamentos administrados por vía vaginal durante los tres días anteriores.

¿A quién se dirige este programa?

Este programa va dirigido a todas las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 65 años de edad.

La periodicidad de la prueba es la siguiente según la edad:

Entre los **25-34 años**: **citología** cada 3 años.

Entre los **35-65 años**: **detección VPH** cada 5 años.

¿Cuál puede ser el resultado?

La mayoría de las mujeres tendrán un resultado de la prueba de cribado cervical normal.

Aquellas pacientes en que se detecten células anormales o presencia del VPH, serán remitidas al servicio de ginecología para poder completar el estudio.

+ info: www.osakidetza.euskadi.eus