

Manejo del paciente CON INGESTA DEL ALIMENTO CONTAMINADO por *Listeria monocytogenes* en Atención Primaria (*)

Situación clínica	Tipo de paciente		
	Embarazada	Sin factores de Riesgo de Infección Invasiva	Con factores de Riesgo de enfermedad invasiva: inmunosupresión; trasplante; enfermedad crónica, ancianos
1. Asintomático	Explicar los signos y síntomas de la infección y recomendar que, si los presenta en los siguientes dos meses , consulte sin demora	Explicar los signos y síntomas de la infección y recomendar que, si los presenta en las siguientes tres semanas consulte sin demora	Explicar los signos y síntomas de la infección y recomendar que, si los presenta en los siguientes dos meses , consulte sin demora
2. Síntomas/signos de infección leve: gastroenteritis sin fiebre	Enviar al hospital	Ofrecer tratamiento con amoxicilina 1 gr/vo./6 h. durante 7 días	Enviar al hospital
3. Síntomas/signos de infección moderada: fiebre elevada con o sin otros síntomas	Enviar al hospital	Enviar al hospital	Enviar al hospital
4. Síntomas/signos de infección grave	Enviar al hospital	Enviar al hospital	Enviar al hospital
(*) Recordar que si sospecha de caso está indicada la declaración urgente EDO			