

## **ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE VACUNACIONES DE LA CAPV 2020**

Manteniendo el compromiso de actualización continua, el Departamento de Salud, siguiendo las recomendaciones Consejo Asesor de Vacunaciones de Euskadi ha realizado las siguientes modificaciones en al Manual de Vacunaciones de Euskadi:

### **CAPÍTULO 3: CALENDARIO VACUNAL INFANTIL Y DE POBLACIÓN ADULTA SANA**

#### **3.1. Calendario vacunal infantil de Euskadi 2020:**

- Sustitución de la vacuna frente a meningococo C por la vacuna tetravalente Men ACWY a la edad de 12 años.

#### **3.2. Calendario vacunal de la población adulta sana:**

- Recomendación de completar 2 dosis de vacuna Triple Vírica en personas susceptibles nacidas entre 1970 y 1980.
- Vacunación frente a poliomielitis **sólo** en procedentes de países con circulación de poliovirus (salvaje o derivado de la vacuna).
- En menores de 26 años sin vacunación previa frente a meningococo C, se administrará una dosis de vacuna frente a meningococo ACWY.

### **CAPÍTULO 4: VACUNAS**

4.8. Se incluye el algoritmo para valorar la respuesta a la vacunación frente a hepatitis B en los grupos de riesgo en los que esté indicado.

### **CAPÍTULO 6: VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO EN EDAD INFANTIL.**

#### **6.1.1. Vacunación de niños/as prematuro/as**

- Modificación de la pauta vacunal frente a neumococo y vacuna hexavalente (DTPa-VPI-VHB+Hib). Pasará a ser 2+1.

#### **6.1.2. Vacunación en inmunodepresión:**

- En todas las situaciones de inmunodepresión, la pauta secuencial frente a neumococo incluye dos dosis de vacuna polisacárida con un intervalo mínimo de 5 años.

##### **6.1.2.1. Inmunodeficiencias primarias:**

- En inmunodeficiencia humoral parcial o déficit fagocítico o los síndromes: Di George parcial, Ataxia telangiectasia, Wiscott-Aldrich y Whim se recomienda vacunación frente a Papilomavirus en niños y niñas.

##### **6.1.2.2. Infección VIH**

- Vacunación frente a meningococos ACWY
  - en <1 año, se sustituye la vacuna frente a meningococo C por la vacuna tetravalente ACWY y se incorpora una dosis adicional a los 5 años de edad.
  - A partir de 12 meses, 2 dosis con intervalo mínimo de 2 meses y una dosis de recuerdo a los 5 años de la última dosis.

– A partir de 6 años: 1 dosis.

- Se recomienda vacunación frente a Papilomavirus en niños y niñas.

#### 6.1.2.7. Vacunación en niños/niñas con asplenia anatómica o funcional

- En el calendario del Recién Nacido con asplenia se modifica la pauta frente a meningoco y se sustituyen todas las dosis por la vacuna tetravalente ACWY con la pauta 2,4,12 meses, 6 años, 12 años.

#### 6.1.3. Vacunación en población infantil con enfermedades crónicas

- La pauta de vacunación frente a Papilomavirus en el calendario infantil será de 3 dosis en los casos de la población infantil de riesgo.
- Se recomienda la vacunación de la población nacida antes de 2015 frente a varicela sin que deban esperar a los 10 años de edad.
- Se incluyen apartados nuevos: Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Celiaquía y Síndrome de Down.

##### 6.1.3.1 insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis. Síndrome nefrótico

- Vacunación frente a neumococo: pauta secuencial en inmunosupresión.

## CAPÍTULO 7: VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA DE RIESGO

### 7.1.1. Inmunodepresión

- En todas las situaciones de inmunodepresión, la pauta secuencial frente a neumococo incluye dos dosis de vacuna polisacárida con un intervalo mínimo de 5 años.

#### 7.1.1.1. Inmunodeficiencias primarias

- En inmunodeficiencia humoral parcial o déficit fagocítico o los síndromes: Di George parcial, Ataxia telangiectasia, Wiscott-Aldrich y Whim se recomienda vacunación frente a Papilomavirus a hombres y mujeres hasta los 45 años de edad.
- En las situaciones de inmunodepresión con indicación de vacunación frente a meningococo ACWY se recomienda una dosis adicional a los 5 años de la última dosis.

#### 7.1.1.2. Infección VIH

- Se recomienda vacunación frente a Papilomavirus a hombres y mujeres hasta los 45 años de edad y vacunación frente a hepatitis A.

#### 7.1.1.5. Trasplante de órgano sólido (TOS)

- En Trasplante de órgano sólido se incluye tabla con las pautas de vacunación.

#### 7.1.1.6. Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)

- Vacunación frente a Papilomavirus a hombres y mujeres hasta los 45 años de edad.
- Utilización de vacuna hexavalente en población de cualquier edad.
- Se incluye tabla con las pautas de vacunación.

### 7.1.2.4. Enfermedad hepática crónica. Alcoholismo crónico. Cirrosis

- En cirrosis y alcoholismo crónico se recomienda:

- Vacunación frente a hepatitis B. Seguir el algoritmo de valoración de respuesta a la vacunación frente a hepatitis B.
- Vacunación frente a hepatitis A.
- Vacunación frente a neumococo: Pauta secuencial.

### 7.1.3 OTROS RIESGOS

#### 7.1.3.2. Síndrome de Down

- Vacunación frente a neumococo: Pauta secuencial de vacunación

#### 7.1.3.5. Enfermedad meningocócica invasiva (EMI) previa

- Vacunación frente a meningococo B y meningococos ACWY

#### 7.2.1. SITUACIONES ESPECIALES

- En personas en situación de prostitución se recomienda vacunación frente a Papilomavirus a hombres y mujeres hasta los 45 años de edad y la vacunación frente a hepatitis B y hepatitis A.
- Hombres que tienen sexo con hombres: se recomienda vacunación frente a Papilomavirus a hombres y mujeres hasta los 45 años de edad y la vacunación frente a hepatitis B y hepatitis A.

#### 7.2.3. RIESGO LABORAL

- Las recomendaciones de vacunación de cada puesto de trabajo así como su administración son obligación de las empresas. No tienen financiación pública.

## **CAPÍTULO 8: ADAPTACIÓN VACUNAL EN PERSONAS NO VACUNADAS O INCOMPLETAMENTE VACUNADAS.**

- Se permite utilizar la vacuna hexavalente (DTPa-VPI-VHB+Hib) hasta 7 años de edad.
- En personas extranjeras no vacunadas procedentes de países con circulación de poliovirus se indicará vacunación frente a poliomielitis.
- En menores de 26 años que no hayan recibido la vacuna frente a meningococo C se indicará la vacuna tetravalente ACWY.

**Se ha marcado en amarillo las partes del manual que han sufrido alguna modificación.**

Todas las modificaciones se han realizado exclusivamente en la versión on-line que encuentran disponible en la web del Departamento de Salud y se puede acceder a través del siguiente enlace:

<http://www.euskadi.eus/informacion/manual-de-vacunaciones/web01-a2gaixo/es/>