



FARMACIA - OSI ARABA

Farmacia de Atención Primaria

e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

Diciembre 2022

SEMANA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ANTIMICROBIANOS

1

[Seguir leyendo](#)

NUEVOS TEMAS PARA BOLETIN INFAC

2

[Seguir leyendo](#)

SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS. ALERTAS AEMPS

Inhibidores de la quinasa Janus: actualización de información de seguridad

Soluciones de Hidroxietil-almidón: suspensión de comercialización

Clormadinona y Nomegestrol acetato: medidas para minimizar el riesgo de meningioma

3

[Seguir leyendo](#)

PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE SUSPENSIONES PEDIÁTRICAS DE AMOXICILINA 250 mg/5 ml

4

[Seguir leyendo](#)

DESINTENSIFICACIÓN DE HIPOGLUCEMIANTES EN PERSONAS MAYORES: NUEVA NOTA URM

Nota de Uso Racional de Medicamentos nº 8 - septiembre 2022

5

[Seguir leyendo](#)

18º INFORME DE FARMACOVIGILANCIA SOBRE VACUNAS FRENTE A COVID-19

6

[Seguir leyendo](#)

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

Destacamos los más relevantes de noviembre 2022

7

[Seguir leyendo](#)

1

SEMANA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ANTIMICROBIANOS

El pasado 18 de noviembre se ha celebrado el [Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos](#), impulsado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) que cada año, desde 2008, lidera una campaña dirigida a profesionales, instituciones, autoridades y población en general, con el objetivo de concienciar sobre el grave problema de salud pública que representa, a nivel mundial, el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) han formado una Alianza Cuatripartita para respaldar la [Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos 2022](#), que se ha celebrado del 18 al 24 de noviembre.

El tema escogido, "**Prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos**", llama a la colaboración entre los diferentes sectores y refuerza el enfoque "*One Health*" - "*Una Sola Salud*", dirigido a lograr la salud óptima para las personas, los animales y el planeta. Con esta visión de conjunto, la Alianza Cuatripartita ha elaborado una [Guía para respaldar la campaña](#) con información, ideas y propuestas para que las distintas partes interesadas se involucren y preparen sus propias actividades a nivel local.

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), como coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), ha organizado la [Jornada PRAN para el Uso Prudente de los Antibióticos](#).

[Volver a INICIO](#)

2

NUEVOS TEMAS PARA BOLETIN INFAC

Como sabéis, los farmacéuticos/as de atención primaria, que elaboramos esta Hoja informativa *FarmaHitzak*, también formamos parte del Comité de Redacción del boletín INFAC, junto con otros profesionales de Osakidetza, Departamento de Salud y UPV/EHU.

En este momento estamos planificando los boletines que se elaborarán en el segundo semestre de 2023, y dado que los principales destinatarios del INFAC sois los profesionales sanitarios de la CAPV, solicitamos vuestra colaboración para que nos hagáis llegar ideas/sugerencias sobre temas que puedan resultar de vuestro interés para abordar en estos boletines. Podéis enviarlas a la siguiente dirección de correo electrónico: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus
Toda aportación será bienvenida y valorada.

[Volver a INICIO](#)

3

SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS. ALERTAS AEMPS

- **Inhibidores de la quinasa Janus para enfermedades inflamatorias crónicas: recomendaciones para minimizar los riesgos de reacciones adversas graves. ACTUALIZACION.**

La AEMPS [ha actualizado la Nota de seguridad](#) el 23 de Noviembre, y recomienda lo siguiente:

- Los pacientes a partir de 65 años, pacientes fumadores o exfumadores que fumaron durante un tiempo prolongado, y aquellos con otros factores de riesgo cardiovascular o de desarrollo de neoplasias, podrán recibir inhibidores de la
-

JAK únicamente cuando no existan alternativas terapéuticas adecuadas. Asimismo, se utilizarán con cautela en pacientes con factores de riesgo de TEV distintos de los mencionados anteriormente.

- En caso de tratar algún paciente con alguno de los factores de riesgo citados, por no disponer de otra alternativa terapéutica, se deberá reducir la dosis.
- En todos los pacientes tratados con inhibidores de JAK se recomienda un examen dermatológico periódico.

➤ **Soluciones de hidroxietil-almidón: suspensión de comercialización a partir del 15 de diciembre**

Como continuación de la nota informativa del mes de junio MUH ([FV 03/2022](#)), en la que se comunicaba la próxima suspensión de comercialización de las soluciones de hidroxietil-almidón en España, la AEMPS ha emitido una [nueva Nota informativa](#) estableciendo la fecha efectiva de dicha suspensión, **el próximo 15 de diciembre**, que afecta a los medicamentos **Isohes[®], Volulyte[®] y Voluven[®]**. **A partir de esta fecha no se podrán utilizar estos medicamentos.**

➤ **Acetato de clormadinona y acetato de nomegestrol: Medidas para minimizar el riesgo de meningioma**

Los laboratorios fabricantes, de acuerdo con la AEMPS, han dirigido una [carta a los profesionales sanitarios](#) comunicando que se ha observado un mayor riesgo de desarrollar meningioma (único o múltiple) después del uso de acetato de clormadinona o acetato de nomegestrol, principalmente a dosis altas durante un tiempo prolongado. El riesgo aumenta con las dosis acumuladas.

En algunos países europeos se encuentran disponibles a dosis altas (acetato de clormadinona 5-10 mg/comp, o acetato de nomegestrol (3,75 – 5 mg/comp) como terapia para diversas alteraciones ginecológicas.

En España, el acetato de clormadinona y el acetato de nomegestrol solo están comercializados a dosis bajas (2 mg y 2,5 mg/comp, respectivamente) y en combinación con etinilestradiol y estradiol como anticonceptivo hormonal. No se ha identificado este aumento de riesgo con estos medicamentos, no obstante, no se puede descartar a dosis acumuladas elevadas.

Estos medicamentos están contraindicados en pacientes con meningioma o antecedentes de meningioma.

Las pacientes deben ser monitorizadas de acuerdo con la práctica clínica. En caso de diagnóstico de meningioma, el tratamiento debe interrumpirse de forma permanente.

Los medicamentos que contienen estos principios activos son: **Etinilestradiol/clormadinona EFG, Balianca[®], Belara[®], Elynor[®], Zoely[®]**.

[Volver a INICIO](#)

4

PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE SUSPENSIONES PEDIÁTRICAS DE AMOXICILINA 250 mg/5 ml

El 18 de noviembre, ante los retrasos de suministro de suspensiones pediátricas orales de amoxicilina de Laboratorios Normon, S.A. y Sandoz Farmaceutica, S.A, la AEMPS publicó una Nota con [recomendaciones para paliar los problemas de suministro y garantizar el tratamiento de todos los pacientes](#). Por su parte, la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud emitió unas instrucciones para llevar a cabo la sustitución en la oficina de farmacia, para lo cual **las recetas se deben imprimirse en papel**.

El proceso de sustitución, en ausencia de amoxicilina 250 mg en solución oral, es el siguiente:

1. Amoxicilina Normon[®] 250 mg polvo para suspensión oral en sobres EFG, 30 sobres (CN700273)
 2. En ausencia de la anterior, cualquiera de las siguientes:
 - Amoxicilina Normon[®] 500 mg comprimidos EFG, 20 comprimidos (CN 694726)
 - Amoxicilina Almus[®] 500 mg comprimidos dispersables EFG (CN 713505)
 - Amoxicilina Ardine[®] 500 mg comprimidos EFG (CN 694743)
-

Estos medicamentos se presentan en comprimidos ranurados de 500 mg, que pueden fraccionarse para administrar medio comprimido, que puede disolverse o disgregarse en agua.

Las prescripciones de amoxicilina SOBRES de 250 mg también podrán ser sustituidas por los comprimidos ranurados de 500 mg mientras persista el problema de suministro de las suspensiones orales.

Los envases de suspensión deben reservarse para los pacientes en los que el ajuste de dosis no pueda obtenerse fraccionando los comprimidos de 500 mg, como los menores de 6 meses.

El 23 de noviembre la AEPMS ha emitido una nota, [MUH 17/2022](#), en la que actualiza la información sobre este problema. Actualmente los laboratorios Normon y Sandoz ya están abasteciendo el mercado de manera continua; sin embargo, el incremento de la demanda, debido a la alta incidencia de infecciones respiratorias y la coincidencia de problemas de producción en los dos laboratorios, puede retrasar la normalización en el suministro, por lo que sigue habilitado el procedimiento para la sustitución en la farmacia en caso necesario.

[Volver a INICIO](#)

5

DESINTENSIFICACIÓN DE HIPOGLUCEMIANTES EN PERSONAS MAYORES: NUEVA NOTA URM

Se ha publicado la [Nota para el uso racional de medicamentos nº 8, de septiembre 2022](#), en la que se recogen recomendaciones para la **desintensificación del tratamiento hipoglucemiante en personas mayores** con una HbA1c <6,5-7%, con el fin de evitar un sobretratamiento que aumente el riesgo de hipoglucemia y sus consecuencias: caídas, deterioro cognitivo y hospitalizaciones.

En las personas mayores frágiles, pluripatológicas, con demencia, con esperanza de vida limitada o diabetes de larga duración, se pueden aceptar niveles de HbA1c menos estrictos (entre 8-8,5%).

[Volver a INICIO](#)

6

18º INFORME FARMACOVIGILANCIA SOBRE VACUNAS FRENTE A LA COVID-19

En este [informe](#), se actualiza la información sobre los siguientes asuntos de seguridad:

- Comirnaty® (Pfizer) y Spikevax® (Moderna): se identifica el sangrado menstrual abundante como posible reacción adversa.
- Spikevax®: se identifica la urticaria como posible reacción adversa.
- Jcovden® (antes COVID-19 Vaccine Janssen): se identifica la parálisis facial como posible reacción adversa.

[Volver a INICIO](#)

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- **Amoxicilina-Clavulánico susp. oral 250/62,5 120 ml ; 125/31 120 ml; 100/12,5 120 ml.** Suministro irregular y cambiante, es necesario consultar en cada momento la disponibilidad en los almacenes de distribución
- **Bonalfa®** 4 mcg/g 50 g pomada (Tacalcitol). Valorar la utilización de otros tratamientos.
- **Buprex 0,2 mg 20 comp.** (Buprenorfina). Valorar la utilización de otros tratamientos.
- **Bydureon** 2 mg pluma (Exenatida). Se ha autorizado la comercialización de unidades con caducidad < 6 meses.
- **Claritromicina Sandoz susp. oral 100 ml** (Claritromicina). Valorar otras presentaciones o cambio de principio activo.
- **Colirofta atropina** 10 mg/ml colirio solución, 10 ml (Atropina). Distribución controlada. Se espera recibir unidades extranjeras a mediados de diciembre.
- **Daivonex** crema 100 g (Calcipotriol). Valorar la utilización de otros tratamientos.
- **Dogmatil** 50 mg/ml amp 2 ml (Sulpirida). Disponible en algún almacén. Valorar el mismo principio activo por vía oral u otras alternativas.
- **Dolomedil** 500 mg/10 mg 20 comp. (Paracetamol/Codeína). Alternativa: combinaciones a otras dosis.
- **Eprosartán/HCTZ** 600 mg/12,5 mg 28 comp. (Futuran plus, Navixen plus, Regulaten plus, Tevicensplus 600). Alternativa: Valorar la utilización de cada principio activo por separado o de otras asociaciones de antihipertensivos.
- **Evenity** 150 mg 2 plumas (Romosozumab). Se ha autorizado la comercialización de unidades con caducidad inferior a 6 meses.
- **Mastical D 500 mg/800 UI** 30 comp. masticables Calcio carbonato / Colecalciferol. Posible alternativa: otras combinaciones de Calcio / Colecalciferol.
- **Melodene-15** 0,06 mg/ 0,015 mg 24+4 comp. (Gestodeno/Etinilestradiol). Alternativa: Milesse tiene la misma composición.
- **Micetal crema** 30 g y 60 g, polvo 30 g, gel 100 g (Flutrimazol). Alternativa: otros antifúngicos tópicos
- **MST Continus®** 10 mg 60 comp lib prolong. (Morfina, sulfato). Alternativa: misma dosis total diaria de morfina de liberación rápida (Oramorph® solución oral) administrada cada 4-6 horas
- **Orbenin susp.** 125 mg/60 ml (Cloxacilina). Disponible en algunos almacenes de distribución. Valorar el uso de otros antibióticos según la indicación.
- **Pantomicina 100 mg/ml granulado para susp. oral** 1 frasco 100 ml (Eritromicina). Alternativa: Existen otros macrólidos en solución oral o suspensión oral.
- **Seretide 25 mcg/50 mcg** inhalador 120 dosis (Salmeterol / Fluticasona). Alternativa: otros medicamentos con misma composición.
- **Setofilm® 4 mg, 8 mg** 10 sobres bucodispersables (Ondansetrón).
- **Sevredol 20 mg** 12 comp. (Morfina, sulfato). Alternativa: otras presentaciones de morfina de liberación rápida.
- **Silkis®** 3 mcg/g tubo 100 g (Calcitriol). Disponible en algunos almacenes. Valorar la utilización de otros tratamientos.
- **Singulair 10 mg** 28 comp. (Montelukast). Disponible en algunos almacenes. Alternativa: presentación de 5 mg.
- **Sinogan 40 mg/ml gotas** 30 ml (Levomepromazina). Unidades limitadas vía medicamentos extranjeros (no requiere informe) o valorar otros tratamientos.
- **Stopcold** 5 mg /120 mg 20 comp. (Cetirizina / Pseudoefedrina). Valorar la utilización de otros tratamientos
- **Suniderma** 1,27 mg/g crema 60 g (Hidrocortisona, aceponato). Alternativa: presentaciones de 30 g (crema, pomada).
- **Tofranil®** 10 mg, 50 mg comp. rec. (Imipramina). Se puede solicitar vía medicamentos extranjeros. No requiere informe.

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- **Benestan®** 2,5 mg 60 comp (Alfuzosina).
- **Daktarin®** 20 mg/g gel oral (Miconazol)
- **Clotrimazol Gine-Canesmed** 100 mg 6 comp vaginales (Clotrimazol)
- **Dolocatil®** 65mg/ml solución oral (Paracetamol)
- **Emerade** 300 mcg plumas precargadas (Epinefrina)
- **Altellus®** 300 mcg pluma precargada (Epinefrina)
- **Trandate®** 100 mg comp. (Labetalol)
- **Rytmonorm** 150 mg comp (Propafenona)
- **Otix®** gotas óticas solución (Trimetoprim, Dexametasona, Polimixina B)
- **Rifinah®** 300 mg/150 mg 60 comp. (Isoniazida/ Riifampicina)

Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- [Tabla Desabastecimientos](#): En Presbide se ha incorporado el botón “Desabastecimientos” que lleva a esta tabla directamente:



[En CIMA-AEMPS: Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

FARMACIA - OSI Araba

Farmacéuticos de Atención Primaria: Javier Martínez e Inés San José

Tfno.: 945 006 752 / 945 006 631

e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

/



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza