



FARMACIA - OSI ARABA

Farmacia de Atención Primaria

[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Mayo 2023

NOTAS DE SEGURIDAD DE LA AEMPS: ESCOPOLAMINA: REACCIONES ADVERSAS POR CONFUSIÓN CON BUTILESCOPOLAMINA

1

[Seguir leyendo](#)

PRESBIDE: AUTORIZACIÓN DE SUSTITUCION EN OFICINA DE FARMACIA DE APOCARD®

2

[Seguir leyendo](#)

ACCESO A MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS EN ESPAÑA: ZINNAT® 25 MG/ML GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL 70 ML.

3

[Seguir leyendo](#)

PRESBIDE: NUEVOS ENLACES i-BOTIKA

4

[Seguir leyendo](#)

PUBLICACIONES DE INTERÉS:

Nuevo INFAC titulado; "INFAC Metodología: Ensayos de no inferioridad, análisis de subgrupos".

Nueva infografía sobre medicamentos dirigida a pacientes y ciudadanía de la SEFAP; ¿Qué información deberías saber sobre los medicamentos si estás en periodo de lactancia?

5

[Seguir leyendo](#)

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO

6

[Seguir leyendo](#)

GUÍA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EN INFECCIÓN URINARIA

7

[Seguir leyendo](#)

NOTAS DE SEGURIDAD DE LA AEMPS: ESCOPOLAMINA: REACCIONES ADVERSAS POR CONFUSIÓN CON BUTILESCOPOLAMINA

El Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) ha recibido cinco casos de reacciones adversas graves relacionados con la administración errónea de escopolamina en lugar de butilescopolamina. Los pacientes afectados requirieron asistencia médica. Los errores detectados indican que la confusión se puede presentar en la prescripción, en la dispensación y en la administración del medicamento.

La denominación muy similar de los dos principios activos los hace susceptibles de confusión; sin embargo, sus indicaciones y dosificación son muy diferentes. Pueden consultarse las fichas técnicas de los distintos medicamentos en el [Centro de Información on line de Medicamentos \(CIMA\) de la AEMPS](#).

La administración por error de escopolamina a dosis de butilescopolamina supone una sobredosis que puede provocar reacciones adversas anticolinérgicas a nivel del sistema nervioso central con consecuencias graves. Los signos y síntomas característicos de la sobredosis de escopolamina son cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa, confusión, desorientación, pérdida de memoria y alucinaciones.

Se puede consultar la nota de seguridad completa de la AEMPS (MUH(FV),04/2023) pinchando [aquí](#).

La infografía tiene un fondo blanco con un recuadro azul oscuro que contiene el título principal en rojo: "Escopolamina y butilescopolamina". A la derecha del título hay un icono de un megáfono y un triángulo de advertencia amarillo. Debajo del título, el subtítulo en azul dice: "Información importante para evitar reacciones adversas por confusión entre ambos medicamentos".

En el centro, hay dos columnas. La izquierda, titulada "Escopolamina" en un recuadro azul, muestra un icono de una gota y un recuadro azul con el texto "Escopolamina B. Braun". La derecha, titulada "Butilescopolamina" en un recuadro azul, muestra un icono de una gota y un recuadro azul con el texto "Buscapina" y "Butilescopolamina Aurovitas". Entre las dos columnas hay un símbolo rojo de "no igual" (≠).

Debajo de estas columnas, un recuadro azul oscuro con el logo "notifica RAM" en rojo y amarillo contiene el texto: "Se han notificado reacciones adversas graves por la administración errónea de escopolamina en lugar de butilescopolamina".

En la parte inferior, hay un recuadro rojo con un icono de un médico y el texto: "Antes de prescribir, dispensar o administrar el medicamento, verificar el nombre, dosis, forma farmacéutica e indicación correspondientes". A la derecha de este recuadro están los logos del "MINISTERIO DE SANIDAD" y de la "agencia española de medicamentos y productos sanitarios".

[Volver a INICIO](#)

PRESBIDE: AUTORIZACIÓN DE SUSTITUCION EN OFICINA DE FARMACIA DE APOCARD®

Con el objetivo de proteger la salud de los pacientes, algunos medicamentos no pueden ser sustituidos por el farmacéutico sin la autorización expresa del médico prescriptor. Entre ellos se incluyen medicamentos biológicos, medicamentos de estrecho margen terapéutico y medicamentos por vía inhalatoria.

Recientemente, ante el desabastecimiento de Apocard® (flecainida) y con el objetivo de garantizar la continuación de tratamientos, se ha autorizado la sustitución en la oficina de farmacia de otras marcas de FLECAINIDA 100 MG COMPRIMIDOS.

Debido a que es un fármaco de estrecho margen terapéutico es necesario que el prescriptor esté informado de este cambio, pero no es necesario realizar ningún cambio en la prescripción.

El paciente será informado en la oficina de farmacia de que el medicamento dispensado es similar al que estaba tomando habitualmente.

Más información sobre medicamentos no sustituibles [aquí](#).

[Volver a INICIO](#)

3

ACCESO A MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS EN ESPAÑA DE DISPENSACIÓN AMBULATORIA: ZINNAT® 25 MG/ML GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL 70 ML.

Debido al desabastecimiento que se prevé de **Zinnat® 250 mg/5 ml granulado para suspensión oral** y **Zinnat® 500 mg granulado para suspensión oral**, se ha autorizado su dispensación a través de medicamentos extranjeros: **Zinnat 25® mg/ml granulado para suspensión oral 70 ml**.

Debido a la diferente concentración de estos 2 medicamentos, es necesario aportar receta en formato papel, **especificando el volumen por toma**.

Se puede consultar la nota informativa de la AEMPS (3/04/2023) pinchando [aquí](#).

[Volver a INICIO](#)

4

PRESBIDE: NUEVOS ENLACES i-BOTIKA

Recientemente se ha ampliado en PRESBIDE los enlaces incluidos en el apartado de **documentación adicional** de algunos medicamentos.

En este apartado se incluyen documentos que se consideran de interés para el profesional sanitario como: notas de Uso Racional del Medicamento (URM) o enlaces de i-botika, con información sobre medicamentos para la ciudadanía. Esperamos que facilite tener a mano información interesante a la hora de la prescripción.

The screenshot displays the 'Posología' (Dosage) tab in the PRESBIDE system. The main area contains fields for 'Dosis por toma' (2 COMPRIMIDO), 'Pauta: cada' (Acostarse), 'Duración del envase en días' (15 días), and 'Envases máximos hasta la fecha de revisión' (19). Below these, there are checkboxes for 'Especificar momento de toma según ingestas' and 'Especificar momento de toma horaria, no asociado a ingestas'. A table allows selecting the time of intake (Desayuno, Comida, Merienda, Cena, Acostarse). On the right, the 'Documentación adicional' section lists links for 'Nota URM: Deprescripción de benzodiazepinas en el insomnio: ¡Es posible!' and 'i-BOTIKA: Detar las pastillas para dormir: sin prisas, pero con pauta'. Below this, there are sections for 'Instrucciones al paciente propuestas en Vademécum' and 'Instrucciones al paciente adicionales', each with checkboxes for specific instructions like 'Al acostarse', 'Puede producir somnolencia', 'No suspenda la medicación sin consultar', and 'No tomar bebidas alcohólicas'. The 'Advertencias al farmacéutico' section is also visible at the bottom.

[Volver a INICIO](#)

Nuevo INFAC publicado

Está disponible en la [web](#) el nuevo boletín INFAC titulado **“INFAC metodología: Ensayos de no inferioridad, análisis de subgrupos.”**

El objetivo de este boletín es ofrecer a los lectores herramientas para realizar una lectura crítica de los ensayos de no inferioridad y de análisis de subgrupos.

Enlaces a los documentos:

- Boletín [Informe \(PDF, 557 KB\)](#) 
- Presentación [PowerPoint \(PPTX, 397 MB\)](#) 

Nueva infografía sobre medicamentos dirigida a pacientes y ciudadanía de la SEFAP: ¿qué información deberías saber sobre los medicamentos si estás en periodo de lactancia?

La Soc. Esp. de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha publicado una nueva infografía sobre medicamentos y lactancia dirigida a pacientes y ciudadanía. En ella se resumen unas recomendaciones generales y se enfatiza en el mensaje de que se debe consultar a un profesional sanitario antes de la toma de medicamentos o productos de herbolario para garantizar la seguridad. También se facilitan otras fuentes de información fiables sobre el tema, como son:

- [e-lactancia](#). Buscador de información sobre medicamentos en la lactancia. Clasifica los medicamentos en función del riesgo: riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo alto y riesgo muy alto. La información de e-lactancia la hacen profesionales de la salud. Se basa en publicaciones científicas actuales.
- [Mother to Baby](#). Página con información sobre el efecto de los medicamentos durante el embarazo y la lactancia materna. Dispone de hojas informativas que contestan a las preguntas más frecuentes elaboradas por la Organización de Especialistas de Información Teratológica (OTIS) de Estados Unidos y Canadá (disponible en inglés y español).
- [Drugs in pregnancy and breastfeeding](#). Página que enlaza con otras fuentes de información sobre medicamentos en embarazo y lactancia (disponible sólo en inglés).
- Aplicaciones como [Lactancia materna](#) de la Asociación Española de Pediatría o [LactApp](#) se pueden descargar gratis para resolver dudas sobre lactancia.

Se puede acceder a esta y otras infografías de la SEFAP en su [página web](#) o directamente pinchando [aquí](#).



Haz CLIC en los iconos para más información

Tu Farmacéutico de Atención Primaria te ayuda

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBERÍAS SABER SOBRE LOS MEDICAMENTOS SI ESTÁS EN PERIODO DE LACTANCIA?

Si tienes que tomar medicamentos en el periodo de lactancia pregunta a tu profesional sanitario para hacerlo de forma segura.

Muchos medicamentos son compatibles con la lactancia, aunque **algunos no se recomiendan** ya que pueden afectar a tu bebé. Antes de empezar a tomar un medicamento, planta o producto de herbolario, **pregunta a tu profesional sanitario.**

¿Debo dejar la lactancia si tengo una enfermedad crónica y tomo medicación de forma habitual?

No, primero consulta a tu profesional sanitario. Muchos medicamentos se pueden tomar durante la lactancia.

¿Cuándo debo tomar el medicamento?

Se recomienda administrarlo **después de la toma de leche** y/o justo **antes del periodo más largo de sueño** del bebé.

¿La salud y la edad del bebé influyen?

Sí, hay más riesgo en bebés prematuros y en los primeros meses de todos los recién nacidos.



¿Qué puedes hacer ante un malestar transitorio?

- Muchas molestias son leves y se resuelven por sí solas. Si tienes dudas, consulta a tu profesional sanitario.
- Los medicamentos que **pueden usarse en niños** normalmente son **seguros** en la lactancia (ejemplo: paracetamol, ibuprofeno).
- Intenta emplear la **mínima dosis** que sea eficaz para tí, durante el **menor tiempo posible**.
- Siempre que sea posible, lo mejor es utilizar medicación por **vía tópica** (cremas, pomadas...).
- Es preferible **no usar** medicamentos que estén **compuestos por varios fármacos**.

 **Existen webs y apps que te pueden ayudar. Ejemplo:** <https://www.e-lactancia.org/> 

Ante cualquier duda, consulta a un farmacéutico u otro profesional sanitario

Bibliografía:

- Utilización de fármacos en la lactancia. Boletín INFAC Volumen 8 - N° 10 / Nov-Dic 2000
- Medicamentos y lactancia. Monografías CADIME. Número 19. Año 2001
- Drugs and Lactation Database (LactMed®)

Atribuciones de imágenes: Ilustración de leche materna pertenece a Freepik (R). Resto de imágenes pertenecen a Genially (R)

Última revisión: 04/2023. N° 19

Editado en Madrid por la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)

ISSN 2952-1734

Para consultas o información sobre conflictos de intereses: pacientes@sefap.org

Autores (en orden alfabético del 1er apellido): B. Basagoti Carreño (CPC, SEFAP), A.Gil Valiño (CPC, SEFAP), E. Prieto Utiel (CPC, SEFAP)

Revisión interna: C. Mozo Avellaneda (CPC, SEFAP)

SEFAP_Lactancia y medicamentos.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

medicamentos en

[Volver a INICIO](#)

6 DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- **Apocard 100 mg 30 y 60 comp.** Flecainida.
- **Bactroban nasal 20mg/g pomada nasal.** Mupirocina.
- **Condrosulf, Condrosan, Droglican 400 mg, caps.** Condroitina sulfato solo y asociado.
- **Dalacin® 100 mg, 3 óvulos vaginales.** Clindamicina.
- **Fiasp 100 U/ml solución inyectable vial.** Insulin aspart.
- **Fluidasa® 150 mg comp.** Mepefilina.
- **Livogiva® 20 mcg/80 mcl pluma.** Teriparatida.
- **Pezimax 2mg/ml sol oral, frasco 150 ml.** Donepezilo.
- **Timolol Sandoz 5mg/ml colirio frasco 3 ml.** Timolol.


RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- **Adartrel, Requib 0,25 y 0,5 mg comp.** Ropinirol.
- **Astonin 0,1 mg comp.** Fludrocortisona.

-
- **Dumirox / Fluvoxamina EFG 100 mg, comp.** Fluvoxamina.
 - **FML 1 mg/ml colirio 5 ml.** Fluometolona.
 - **Ibuprofeno 2% 200 ml, jarabe.** Ibuprofeno.
 - **Metoclopramida Kern Pharma 1 mg/ml sol oral -250 ml.** Metoclopramida.
 - **Noiafren 10 mg, comp c/20.** Clobazam.
 - **Sinogan 25 mg, 20 comp.** Levomepromazina
 - **Sumial/Propanolol 40 mg comp.** Propranolol.
 - **Synalar ótico, gotas.** Fluocinolona.

Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- [Tabla Desabastecimientos](#): En Presbide se ha incorporado el botón “Desabastecimientos” que lleva a esta tabla directamente:



En CIMA-AEMPS: [Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

7 GUÍA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EN INFECCIÓN URINARIA

El “Grupo de trabajo de actualización de Guías antimicrobianas en Atención Primaria” de la OSI Araba ha publicado la **GUÍA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EN INFECCIÓN URINARIA** que se puede encontrar en la intranet de la OSI Araba:

> es > Salud > Apoyo a profesionales > Protocolos, Procedimientos, Guías y Documentos Apoyo AP > PROA-AP

Se puede consultar esta Guía pinchando [aquí](#)

[Volver a INICIO](#)

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba
Farmacéuticos de Atención Primaria: Javier Martínez e Inés San José
Tfno.: 945 006 752 / 945 006 631

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:
farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza