



FARMAZIA – ARABAKO ESI-A
 Lehen Mailako Farmazia
 e-mail.: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

2023-ko Azaroa

1. LEHEN MAILAKO ARRETAKE FARMAZIARI (LMAF) BURUZKO JARDUNALDIA	1 Jarraitu irakurtzen
2. ARNAS BIRUS SINTZITALAREN (ABS) AURKAKO IMMUNIZAZIOA EUSKADIN	2 Jarraitu irakurtzen
3. EUSKAL HERRIKO PEDIATRIA ELKARTEAREN (EHPE) ALERGOLOGIA PEDIATRIKOKO LANTALDEAREN POSIZIONAMENDUA, GRIPEAREN AURKAKO TXERTAKETARI ETA ARRAUTZAREKIKO ALERGIARI BURUZ.	3 Jarraitu irakurtzen
4. OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN MIKROBIOEN AURKAKO GIDA TERAPEUTIKOA EGUNERATZEA (GIZA OSASUNA): AWaRe TRESNA TXERTATZEA	4 Jarraitu irakurtzen
5. GLP-1 HARTZAILEEN AGONISTAK ETA TIROIDEKO MINBIZIAREN ARRISKUA	5 Jarraitu irakurtzen
6. ADMINISTRAZIO SISTEMIKOKO EDO INHALATUKO FLUORKINOLONAK: ERABILERA-MURRIZKETEI BURUZKO OROIGARRIA	6 Jarraitu irakurtzen
7. INKLISIRAN: PAZIENTE ANBULATORIOAK OSPITALEKO FARMAZIA-ZERBITZUETATIK BANATZEA	7 Jarraitu irakurtzen
8. HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN -Asoziazio berria: Memantina/Donepezilo -Finantzaketa gabeko indikazioak: Leuprorelina depot -Indikazio berria: Dalteparina	8 Jarraitu irakurtzen
9. ARGITALPEN INTERESGARRIAK -INFAC berria argitaratu da: Erabilera arrunteko bitaminak eta mineralak: eraginkortasuna eta segurtasuna. -Posizionamendu terapeutikoko txostenak: Tirzepatida (Monjauro®), Delafloxacin (Quofenix®) -SEFAP infografia berria: Zer jakin behar duzu opiodeei buruz min kroniko ez-onkologikoa tratatzeko?	9 Jarraitu irakurtzen
10. HORNIDURA-GABEZIAK ETA -BERREZARPENAK	10 Jarraitu irakurtzen
11. SHINGRIX® TXERTOIA: ALDAKETA	11 Jarraitu irakurtzen

1 LEHEN MAILAKO ARRETA KO FARMAZIARI (LMAF) BURUZKO JARDUNALDIA

Azaroaren 21ean, **Talde-lana, zer ekarpen egiten du Lehen Mailako Arretako farmaziak?** jardunaldia egingo da, Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko ekitaldi-aretoan (13:00etatik 15:00etara), eta zoomaren bidez ere jarraitu ahal izango da. Bertan, LMAFek hainbat eremutan egindako lana ezagutaraziko dugu, hala nola medikazioaren berrikusketa, medikamentuei buruzko informazioa, lehen mailako arretan mikrobioen aurkako medikamentuen erabileraren optimizazioa (PROA) eta LMAFek beren lanean egin dioten ekarpenari buruzko familia-mediku baten ikuspegia. Jardunaldi honetan parte hartzera animatzen zaitugu, aurrez aurre edo zoom bidez [Jakinsareatik](#).

[HASIERA-ra Itzuli](#)

2 ARNAS BIRUS SINTZITALAREN (ABS) AURKAKO IMMUNIZAZIOA EUSKADIN

Duela gutxi, nirsebimab antigorputz monoklonala erabiltzea baimendu da ABSaren aurkako immunizaziorako. Osasun Sailak, Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordearen gomendioei jarraikiz, nirsebimab bidezko immunizazioa sartu du haur-populazioan, eta lehentasuna eman die ABSak eragindako gaixotasun larria izateko arrisku handia duten biztanleei, eta jaioberri osasuntsuak ere sartu ditu ABSaren zirkulazio-denboraldian.

Xede-populazioa 2023-2024 aldiko ABSaren zirkulazio-denboraldian jaiotako biztanleak izango da (2023/10/01etik 2024-03/31ra), eta 2023-07-01etik 2023-09-30era arte jaiotako populazioari erreskateko bat jarriko zaie.

Antigorputz monoklonalaren hornidura mugatua aurreikusten den hasierako fase batean (2023ko urriaren erdialdetik azaroaren erdialdera), xede-populazioa immunizatzen hasiko da ospitale-eremuan, eta gaixotasun larria izateko arrisku handia dutenei lehentasuna emango zaie:

- 2022/10/01etik aurrera jaiotako haurrak, 35 aste baino gutxiagoko haurdunaldiak
- 2022/10/01etik aurrera jaiotako haurrak, ABSak eragindako bronkiolitis larria izateko arrisku handia duten patologiak dituztenak.

Nirsebimabaren hornidura egonkorra bermatzen den unetik aurrera, xede-populazioari ospitaleetan zein lehen mailako arretan eman ahal izango zaio.

Nirsebimabeko dosi bakarra emango zaie muskulu barneko bidetik garaian zehar, ahal dela jaio ondorengo lehen 24-48 orduetan, ospitaleko alta baino lehen. Ezin bada, lehenbailehen eman beharko da, eta Lehen Mailako Arretan egin ahal izango da.

Erabiliko den produktua Beyfortus® da, eta bi aurkezpenetan dago eskuragarri:

- Aurrez kargatutako xiringa, 0,5 ml-tan 50 mg-rekin, 5 kg-tik beherako gorputz-pisua duten haurrentzat ([fitxa teknikoa](#))
- Aurrez kargatutako xiringa, 1 ml-tan 100 mg-rekin, ≥ 5 kg-ko gorputz-pisua duten haurrentzat ([fitxa teknikoa](#))

Informazio gehiago nahi izanez gero, [sakatu hemen](#).

[HASIERA-ra Itzuli](#)

3 EUSKAL HERRIKO PEDIATRIA ELKARTEAREN (EHPE) ALERGOLOGIA PEDIATRIKOKO LANTALDEAREN POSIZIONAMENDUA, GRIPEAREN AURKAKO TXERTAKETARI ETA ARRAUTZAREKIKO ALERGIARI BURUZ.

2023-2024ko kanpainen, gripearen aurkako txertoaren xede-populazio pediatrikoak arriskuko populazioaz gain, 6 eta 59 hilabete bitarteko haurrak ere hartzen ditu.

Arrautzari alergia dioten pazienteen kasuan, jan ondoren behatutako zeinuen arabera, Osakidetzak gomendatzen du:

- Zeinu kliniko ARINEN kasuan: ez dago txertoa jartzeko kontraindikaziorik.
- Sintoma EZ LARRIEN kasuan: gripearen aurkako txertoa zure osasun-zentroan eman daiteke, eta behaketa-aldia 30 minutukoa izatea gomendatzen da.
- Sintoma LARRIEN kasuan: haurren alergologiako espezialistek baloratuko dute gripearen aurkako txertoa ematea kontsultarteko ez presentzial baten bidez:
 - Osasun Sistema Nazionalaren Lurralde Kontseiluak, alergologiako eta pediatriako estatu-mailako zein Europako elkarteek, bibliografia zabalean oinarrituta, gripearen kontrako txerto hauen segurtasuna bermatzen dute arrautzari alergia larria (anafilaxia) dioten pazienteen kasuan: 1 mikrogramo oboalbumina baino gutxiago duten gripearen kontrako txertoak (adibidez, Fluarix Tetra®). Beraz, baimena ematen dute populazio horrek gripearen aurkako txertoa har dezan zentroetan (ez nahitaez ospitaleetan). Horretarako trebatutako langileek emango diete txertoa, balizko erreakzio larriei erantzuteko bitartekoein; txertoa eman ondoren, 30 minutuko gainbegiratzea egin beharko da.
 - Gainera, txerto tetrabalente bat dago merkaturatua (Flucelvax Tetra®), zeina zeluletan kultibatzen baita oilasko-enbrioian beharrean. Txerto hori eskuragarri dugu ESletan eta arrautza-proteinarik ez duenez, 2 urtetik gorakoentzat baimenduta dago. Kasu horretan, espezialistak ez luke baloraziorik egin beharko.

Ikus ohar osoa [hemen](#).

[HASIERA-ra Itzuli](#)

4

OSASUN SISTEMA NAZIONALAREN MIKROBIOEN AURKAKO GIDA TERAPEUTIKOA EGUNERATZEA (GIZA OSASUNA): AWaRe TRESNA TXERTATZEA

Osasun Sistema Nazionalaren (OSN) Mikrobioen Aurkako Gida Terapeutikoa Antibiotikoekiko Erresistentziaren aurkako Plan Nazionalaren (PRAN) esparruan garatutako aplikazioa da, tratamendu antibiotikoen preskripzioa optimizatzeko eta homogeneizatzeko, eta, horrela, mikroorganismo erresistenteak agertzeko arriskua murrizteko. Lehen mailako arretako, pediatriako, larrialdietako, odontologiako eta zentro soziosanitarioetako osasun-profesionalei zuzenduta dago.

Duela gutxi, [AWaRe tresna](#) sartu da Gida Terapeutikoan. OMEk garatu du, eta antibiotikoak hiru taldetan sailkatzen ditu (Sarbidea-Kontuz-Erreserba). Sindrome infekzioso ohikoenen jarraibide terapeutikoak kontuan hartzen dituen ikuspegi metodologikoan oinarritzen da, eta sailkapen honekin batera doan sinbolo bakoitzarekin gidan adierazitako honako talde hauek ezartzen ditu:

 Antibióticos del grupo "Access" (Acceso) de la clasificación AWaRe	 Antibióticos del grupo "Watch" (Precaución) de la clasificación AWaRe	 Antibióticos del grupo "Reserve" (Reserva) de la clasificación AWaRe
En este grupo se incluyen los antibióticos que constituyen la primera o segunda línea de tratamiento empírico para los síndromes infecciosos más prevalentes, en base a la evaluación de la evidencia disponible, con un perfil de seguridad favorable y un bajo potencial de generación y/o selección de resistencias.	En este grupo se incluyen los antibióticos que presentan un mayor potencial de generación y/o selección de resistencias y desempeñan un papel clave en la medicina humana. Se trata de la opción más efectiva para un grupo limitado de síndromes infecciosos bien definido y su utilización debería ser monitorizada estrechamente y estar limitada a indicaciones específicas	En este grupo se incluyen antibióticos de "último recurso", con actividad frente a patógenos multi-resistentes (MDR) o extremadamente resistentes (XDR) y que deben utilizarse únicamente cuando el resto de alternativas terapéuticas no resulten de utilidad o hayan fracasado.

Tresna honen helburua da "Watch" (Kontuz) eta "Reserve" (Erreserba) taldeetako antibiotikoen erabilera murriztea eta, hala dagokionean, "Access" (Sarbidea) taldeko antibiotikoen erabilera erlatiboa eta eskuragarritasuna handitzea.

Hurrengo esteketan, Mikrobioen aurkako Gida Terapeutikoaren App eta web bertsioetara jo dezakezue:



[ANDROID gailuak](#)

[IOS gailuak \(Apple\)](#)

[Web bertsioa \(zure nabigatzailerako\)](#)

Antibiotikoak zuhurtziaz erabiltzeko PRAN jardunaldia 2023

Azaroaren 17an, Antibiotikoak Zuhurtziaz Erabiltzeko Europako Eguna dela-eta, PRANek eta AEMPSeK dibulgazio-jardunaldi bat antolatu dute, gizartea oro har eta osasun-arloko profesionalak mikrobioen aurkako erresistentziaren arazoaren larritasunaz eta gai horri aurre egiteko antibiotikoak zuhurtziaz erabiltzearen garrantziaz sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko.

[Hemen](#) informazio gehiago.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

5

GLP-1 HARTZAILEEN AGONISTAK ETA TIROIDEKO MINBIZIAREN ARRISKUA

EMAren segurtasun-batzordeak (PRAC) ondorioztatu du eskura dagoen ebidentziak ez duela babesten lotura kausalik GLP-1 hartzailearen agonisten (exenatida, liraglutida, dulaglutida, semaglutida eta lixisenatida) eta tiroideko minbiziaren artean.

Azterlan bat argitaratu ondoren, PRACak segurtasun-seinale hori ebaluatzeari ekin zion. Azterlan horrek iradokitzen zuen tiroideko minbizia izateko arrisku handiagoa egon zitekeela medikamentu horiek 2 motako DM zuten pazienteetan. Argitaratutako informazioaren ebidentzia berrikusi ondoren, behaketa-azterlanak eta merkaturatze-baimenen titularrek aurkeztutako datu metagarriak barne (datu ez-klinikoak, klinikoak eta merkaturatu ondokoak), batzordeak ez du produktuaren gaineko informazioaren eguneratzerik behar.

Liraglutida (Victoza®, Saxenda®), semaglutida (Ozempic®, Rybelsus®), exenatida (Byetta®), dulaglutida (Trulicity®) eta lixisenatida (Lyxumia®) dituzten produktuak merkaturatzen dituzten laborategi titularrek gertutik zaindu behar dituzte gertaera horiek, farmakozaintzako beren jardueren barruan.

[Hemen](#) informazio gehiago.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

6

ADMINISTRAZIO SISTEMIKOKO EDO INHALATUKO FLUORKINOLONAK: ERABILERA-MURRIZKETEI BURUZKO OROIGARRIA

2018ko urrian, AEMPSeK [MUH \(FV\) 14/2018](#) oharra argitaratu zuen, fluorkinolona sistemikoak edo inhalatuak erabiltzeko murrizketei buruzkoa. 2023ko urrian, berriz ere, [ohar](#) batean gogorarazi zuen farmako horiek larriak, ezgaitzaileak, iraupen luzekoak eta itzulezinak izan daitezkeen kontrako erreakzioekin lotzen direla, nahiz eta ondorio horiek oso

gutxitan agertzen diren arren. Horregatik, medikamentu horiek baimendutako indikazioetarako baino ez dira preskribatu behar.

AEMPSeK, PRANekin batera, inkesta bat egin du segurtasun-mezu giltzarrien ezagutza-maila eta ulermena ebaluatzeko, fluorokinolonak (administrazio sistemikoko edo inhalatuko) erabiltzeko murrizketei dagokienez, antibiotiko-talde hori agindu, eman edo administratzen duten osasun-profesionalen artean. Inkestaren emaitzek erakusten dute osasun-profesional gehienek ondo erantzundako erantzunen tasa handia dela.

Egin klik [esteka](#) honetan fluorkinolonak erabiltzeko gomendioak ikusteko.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

7

INKLISIRAN: PAZIENTE ANBULATORIOAK OSPITALEKO FARMAZIA-ZERBITZUETATIK BANATZEA

2023ko azarotik, Osasun Sistema Nazionalaren esparruan erreserba bereziak ezarri dira inklisiran printzipio aktiborako (Leqvio® 284 mcg aurrez kargatutako xiringa). Erreserba horien bidez, ospitaleetako farmazia-zerbitzuetatik paziente ambulatorioetara mugatu da erreserba horien banaketa.

Inklisiran gomendatzen da hiperkolesterolemia primarioa (heterozigotiko familiarra eta ez-familiarra) edo dislipidemia mistoa duten helduentzat, dietaren lagungarri gisa:

- Beste tratamendu hipolipemiatzaile batzuekin batera, estatinekiko intolerantzia duten pazienteentzat edo estatinak kontraindikaturak dituztenentzat.
- Estatina edo estatina batekin eta beste tratamendu hipolipemiatzaile batzuekin batera, CLDL helburuak estatina baten gehieneko dosiarekin lortzen ez dituzten pazienteengan.

Honako paziente talde hauentzat finantzatzeko da:

- Kontrolatu gabeko hiperkolesterolemia familiar heterozigotoa (HFHe) duten pazienteak (LDL-kolesterolemia 100 mg/dl-tik gorakoa), estatinen gehieneko dosi toleratuarekin (bakarrik edo ezetimibarekin konbinatuta)
- gaixotasun kardiobaskular ezarria duten pazienteak (kardiopatia iskemikoa, gaixotasun zerebrobaskular iskemikoa edo gaixotasun arterial periferikoa), kontrolatu gabeak (LDL-k 100 mg/dl-tik gora), estatinen gehieneko dosi onartuarekin (bakarrik edo ezetimibarekin batera)
- aurreko taldeetako edozein paziente, estatinekiko intolerantzia badu edo estatinak kontraindikaturak badaude eta 100 mg/dl-tik gorako C-LDL badu.

[Fitxa teknikorako](#) esteka.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

8

HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN

Hauek dira [2023ko azaroko](#) berrikuntzak.

2023eko azaroa		
	Memantina/ Donepezilo	Dezipar®, Domex® 10/10 mg eta 10/20 mg, 28 konp. estaliak. Asoziazio berria: Alzheimer-en gaixotasuna tratatzeko ordezkapen-terapiarako, behar bezala kontrolatuta donepezilorekin eta memantinarekin, dosi finkoetan emandako dosi berdinekin batera, baina medikamentu bereizi gisa.

	Leuprorelina depot	Leuprorelina GP-PHARM® Depot hilekoa 3,75 mg, 1 askapen luzeko biala. Osasun Sistema Nazionalaren prestazio farmazeutikoan ez dira sartzen honako indikazio hauek: - Umetokiko fibromak. - Endometriosia. - Bularreko minbizi aurreratua menopausia aurreko eta ondoko emakumeengan, hormona-tratamendua egokia denean. - Tamoxifenoarekin edo aromatasaren inhibitzaile batekin konbinatuta, bularreko minbizi hormonosentikorraren tratamendu adjubantea, egoera goiztiarrean, errepikatze arrisku handia duten menopausia aurreko eta ondoko emakumeetan. - Obulutegiaren funtzioari eustea gaixotasun neoplasikoa duten eta kimioterapia-tratamenduan (obulutegiko gutxiegitasun goiztiarra eragin ahal duena) dauden emakumeetan, zeinak premenopausian dauden. - Pubertaro goiztiar zentrala (PGZ) haurrengan, bigarren mailako sexu-ezaugarriak bederatzi urte baino lehen agertzen direlako klinikoki diagnostikatua neskengan eta hamar urte baino lehen mutilengan.
	Dalteparina	Fragmin® 2.500 UI/0,2 ml sol injek. aurrez kargatutako 10 xiringa. Pediatriako erabilera berria: tronboenbolismo benoso sintomatikoa (TBS) tratatzeko, hilabete bat duten eta adinekoak diren paziente pediatrikoetan.

 Merkaturatutako printzipio aktibo berria (edo lehendik dagoen bat administratzeko bide berria)

 Indikazioa, finantzaketa edo preskripzio- eta dispentsazio-baldintzak murriztea

 Indikazioa, finantzaketa edo preskripzio- eta dispentsazio-baldintzak zabaltzea

2020ko urtariletik aurrerako berritasunak jasotzen dituen dokumenturako [esteka](#)

[HASIERA-ra Itzuli](#)

9 ARGITALPEN INTERESGARRIAK

INFAC berria argitaratu da

[Webgunean](#) eskuragarri dago INFAC buletin berria: "**Erabilera arrunteko bitaminak eta mineralak: eraginkortasuna eta segurtasuna**". INFAC honen helburua bitaminen eta mineralen bidezko osagarriek biztanleria orokorrean eta populazio espezifikoeetan (haurdunaldia, populazio pediatrikoa, dieta murriztaileak dituzten pertsonak eta kirurgia bariatrikoa egin duten pazienteak) patologia zehatzak prebenitzeko duten eraginkortasuna eta segurtasuna berrikustea da.

Dokumentuen estekak:

- [Buletina](#)
- [Aurkezpena](#)

Posizionamendu terapeutikoko txostenak

Tirzepatida (Monjauro®) 2 motako diabetes mellitusean. IPT-184/V1/16102023


Esteka [hemen](#).

Delafloxazino (Quofenix®) komunitatean hartutako pneunomian. IPT-186/V1/16102023

Esteka [hemen](#).

SEFAPen infografia berria: Zer jakin behar duzu opioideei buruz min kroniko ez-onkologikoa tratatzeko?

Lehen Mailako Arretako Farmazialarien Espainiako Elkarteak (SEFAP) infografia berri bat argitaratu du min kroniko ez onkologikoa opioideen erabilerari buruz.



Infografía esteka hauetan dago eskuragarri:

- [Pdf formatu interaktiboa](#)
- [Aurkezpen interaktiboaren formatua](#)

SEFAPen infografia hau eta beste batzuk [web-orrian](#) zuzenean ikus daitezke.

Era berean, **Opiodeoak, zer jakin behar duzu?** i-botikan ere badago, 2021ean argitaratua. Esteka [hemen](#).

[HASIERA-ra Itzuli](#)

10 HORNIDURA-GABEZIAK ETA -BERREZARPENAK

Hona hemen hilabete honetako HORNIDURA-GABEZIArik garrantzitsuenak:


- Amchafibrin[®], Ácido tranexámico Zentiva[®] 500 mg konp.** (Azido tranexamikoa)
- Atamax[®], Atomoxetina Cinfa[®] 10 mg 7 eta 28 kapsula.** (Atomoxetina)
- Atamax[®] 25 mg 7 eta 28 kapsula.** (Atomoxetina)
- Atamax[®], Atomoxetina Cinfa[®] 40 mg 7 eta 28 kapsula.** (Atomoxetina)
- Atamax[®] 25 mg 7 eta 28 kapt.** (Atomoxetina)
- Jorveza[®] 1 mg 60 ahoan zehar sakabanatzen diren konp.** (Budesonida)
- Rivotril[®] 1 mg/ml soluzio injektagarria 5 anpoila 1 ml** (Klonazepama)
- Orbenin[®] 125 mg/5 mg ahotik hartzeko suspentsioa** (Kloxazilina)
- Escitalopram Viso[®] 5 mg 28 konp.** (Eszitaloprama)
- Virgan[®] 1,5 mg/g gel oftalmikoa** (Ganziklobirra)
- Levetiracetam Aristo[®], Levetiracetam Aristogen[®] 750mg 60 konp.** (Lebetiracetama)
- Solsint[®] 50 mcg ahotiko soluzioa dosi bakarreko ontziak** (Lebotiroxina sodikoa)
- Relistor[®] 12 mg/0,6 ml soluzio injektagarria 1 eta 7 bial** (Metilnaltrexona)
- Sotapor[®] 80 mg 30 konp.** (Sotalola)

HORNIDURA-BERREZARPENAK:

- **Daxas**® 250 mcg konp. (Roflumilasta)
- **Celestone Cronodose**® 2 ml 1 biala (Betametasona fosfatoa/Betametasona azetatoa)
- **Kreon**® 35.000U 100 kapt. (Pankreatina)
- **Softacort**® 3,35 mg/ml kolirioa dosi bakarrek 30 (Hidrocortisona fosfato sodioa)
- **Lantanon**® 10 mg, 60 konp. (Mianserina)
- **Lamisil**® 10 mg/g espraia larruazaleko erabilera 30 ml-ko 1 flasko (Terbinafina)
- **Arixtra**® 5 mg/0,4 ml sol. inektagarria 10 aurrez kargatutako xiringa 0,4 ml (Fondaparinux sodikoa)
- **Pezimax**® 2 mg/ml ahotiko solizioa 150 ml (Donepeziloa)
- **Adartrel**® 0,25 mg 12 konp., Requip 0,25 mg 84 konp. (Erropinirola)
- **Adartrel**® 0,5 mg 84 konp., Requip 0,5 mg 21 konp. (Erropinirola)
- **Adartrel**® 2 mg 28 konp., Requip 2 mg 84 konp. (Erropinirola)

Medikamentuen hornikuntza eza

Presbiden, «Hornikuntzarik eza» botoia eskuragarri dago, «Preskripzioen kontsulta» pantailaren beheko aldean, hornikuntzarik ezari buruzko informazio erabilgarriarekin.



[HASIERA-ra Itzuli](#)


11 SHINGRIX® TXERTOIA: ALDAKETA

Dakizuenez, Shingrix da herpes zosterra (ZO) eta neuralgia postherpetikoa (NPH) prebenitzeko txertoa.

Orain arte, Shingrix-a hautsdun bide bateko eta esekiduradun bide bateko ontzietan zegoen eskuragarri, eta, beraz, txertoa jartzeko orduan, bi bideak hartzen ziren.

Baina orain, dosi anitzeko ontzietan bidaltzen ari dira (10 bide hautsarekin eta 10 bide esekidurarekin), eta horrek segurtasun-arazoren bat eragin du, txertoa jartzeko orduan 2 adjubante erabili baitira.

Horrelakorik gerta ez dadin, farmaziatik eskatzen dizuegu antigeno-dosi bat + adjubante-dosi bat lotu dezazuela zeloarekin, biak batera harrapa daitezen.



Lehen Mailako Arretako Farmazia
ARABako ESI-A: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus
Farmazialariak: Javier Martínez, Inés San José
Tfno.: 945 006752 / 945 006631



Argitalpen honen edukia Osakidetza Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da