

ZOSTER HERPESAREN AURKAKO TXERTAKETA (2023/11/06an eguneratua)

Osasun Sailak, Txertaketen Euskadiko Kontseilu Aholku Batzordearen gomendioei jarraituz eta Osasun Publikoko Batzordeak onartu ondoren, 2022an Zoster Hepesaren aurkako txertoa jartzeko gomendioa jarri zuen martxan. Gomendio horiek eguneratu egin dira, eta, gaur egun, arrisku handiko populazioa eta adinaren arabera txertaketa barne hartzen ditu.

ARRISKU HANDIKO POPULAZIOAREN TXERTAKETA

18 urtetik gorako populazioa, arrisku baldintza hauetakoren bat dutenak:

- Sortzaile hematopoietikoen transplantea (SHT):
- Organo solidoen transplantea (OST) edo beraren zain dauden pertsonak.
- Fase altiboan dauden hemopatia gaiztoak.
- Ahotiko tratamendua JAKen kontrako farmakoekin edo Zoster Herpesa izateko arriskua areagotzen duten beste botika batzuekin (immunosupresio handia eragiten dutenak).
- GIBa.
- Kimioterapiarekin tratamenduan dauden tumore solidoak.
- Zoster Herpesaren 2 gertakari edo gehiagoren aurrekaria.
- 50 urtetik aurrera, beste farmako immunomodulatzailerik edo immunosupersortzaile batzuekin tratamenduan dauden pertsonak.

Ospitaleetako prebentzio-medikuntzako zerbitzuek zein lehen mailako arretako zentroek arrisku taldeei zuzendutako beste txerto batzuk ematen dizkieten moduan, osasun-sistematikiko edozein kontaktu aprobetxatzea gomendatzen da, populazio-talde horien txertaketa oportunistak egiteko.

ADINAREN ARABERA TXERTAKETA

Dosiak eskuragarri daudenez gero, txertaketa handitu egingo da, 65 urte edo gehiagoko pertsona guztiak barne hartuz.

Pertsona horiei txertoa jartzeko gonbita egitea gomendatzen da, bai eta osasun-sistematikarekin duten edozein kontaktu aprobetxatzailea ere, txertaketa oportunistak egiteko.

TXERTOAREN EZAUGARRIAK

Gaixotasun horri aurrea hartzeko eskuragarri dagoen txertoa Shingrix (ZO/su) txertoa da.

Txerto inaktibatua erantsia da.

Berrerratzeari eskatzen du.

Emateko bidea: muskulu barnetik.

Emateko jarraibidea: txertoaren bi dosi, 2 hilabeteko tarteararekin. Imunosupresioa duten pertsonen kasuan, bi dosien arteko gutxienezko tartea hilabetekoa izan daiteke.

Beste txerto batzuekin batera administratzea: aldi berean eman daiteke urtaroko gripearen aurkako txerto inaktibatuarekin, pneumokokoen aurkako 23-balenteko txertoarekin (VNP23) edo difteriaren aurkako txertoarekin, tetanosaren aurkako txertoarekin, eta kukutxeztularen aurkako txertoarekin (dTpa).

Kontraindikazioa: txertoaren osagairen batekiko edo aldez aurreko dosiarekiko hipersentikortasuna.

Ez dago haurdunaldiko erabilerari buruzko daturik.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.

Itziar Larizgoitia Jauregui

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria