



FARMACIA - OSI ARABA
Farmacia de Atención Primaria
[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Febrero 2024	
RECOMENDACIONES SOBRE USO DE VALPROATO EN VARONES PARA EVITAR EL RIESGO DE TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO EN SUS HIJOS E HIJAS	1 Seguir leyendo
ERRORES Y RIESGOS PERSISTENTES ASOCIADOS CON LA MEDICACIÓN	2 Seguir leyendo
IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS ORALES	3 Seguir leyendo
NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA	4 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS - Boletín INFAC: Tratamiento farmacológico de la osteoporosis - Nueva infografía de SEFAP: ¿Quieres saber más sobre cómo manejar las infecciones en niños? - Nuevo medicamento a examen: citisiniclina/citisina - Lista de medicamentos a evitar en 2024 (<i>Revue Prescrire</i>) - Nuevas indicaciones de un fármaco alejadas de la indicación original ¿ventaja añadida?	5 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	6 Seguir leyendo
INFOGRAFÍA VACUNA HERPES ZOSTER	7 Seguir leyendo
CAMPAÑA MEJORA SEGURIDAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS EN FARMACIAS DE ÁLAVA	8 Seguir leyendo

1

RECOMENDACIONES SOBRE USO DE VALPROATO EN VARONES PARA EVITAR EL RIESGO DE TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO EN SUS HIJOS E HIJAS

El 15 de enero de 2024, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado una nota de seguridad con los resultados de un estudio observacional retrospectivo realizado en varios registros de los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia) [EUPAS34201](#), que sugieren un aumento del riesgo de trastornos del neurodesarrollo en niños y niñas cuyos padres habían recibido valproato en los tres meses previos a la concepción, comparado con niños y niñas cuyos padres habían recibido lamotrigina o levetiracetam en monoterapia.

Se establecen las siguientes recomendaciones sobre el uso de valproato en varones:

- El tratamiento lo inicie o supervise un especialista en el tratamiento de la epilepsia o el trastorno bipolar.
- Informar a los varones que actualmente reciben tratamiento con valproato de ese riesgo potencial.
- Valorar con los pacientes varones la necesidad de implantar medidas anticonceptivas, incluso para su pareja, mientras usan valproato y durante al menos 3 meses después de suspender el tratamiento.
- Informar a los pacientes varones sobre la necesidad de revisiones periódicas para evaluar si el valproato sigue siendo el tratamiento más adecuado y valorar alternativas de tratamiento.
- Aconsejar a los pacientes varones que no donen esperma durante el tratamiento con valproato ni durante al menos 3 meses después de la interrupción del mismo.

Medicamentos comercializados en España que contienen valproato: Ácido valproico Aurovitas®, Depakine®, Depakine Crono®, Valproato Altan®.

Para más información se puede consultar la nota MUH (FV), 1/2024 en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

2

ERRORES Y RIESGOS PERSISTENTES ASOCIADOS CON LA MEDICACIÓN

El *Instituto Emergency Care Research Institute* (ECRI) junto con al *Institute for Safe Medication Practices* (ISMP) han publicado un informe sobre las 10 mayores preocupaciones que comprometen la seguridad del paciente en Estados Unidos en 2023 y que consideran que tienen que ser abordadas por las instituciones sanitarias, ya que podrían evitarse o minimizarse implementando cambios factibles en los sistemas y en los procesos asistenciales. En esta ocasión, 3 de los 10 problemas recogidos en el informe se refieren a riesgos persistentes asociados al uso de los medicamentos:

- No confiar solo en los “cinco correctos” (paciente, fármaco, dosis, vía y tiempo) para garantizar la administración segura de los medicamentos.
- Administración accidental de agentes bloqueantes neuromusculares.
- Errores en la conciliación de la medicación en las transiciones asistenciales.

La **conciliación de la medicación** es la práctica que se ha desarrollado con el fin de mejorar la comunicación y reducir los errores de medicación en las transiciones asistenciales. Es un proceso formal y multidisciplinar que requiere:

- Obtener una historia farmacoterapéutica o lista completa y exacta de todos los medicamentos que está tomando el paciente.
- Compararla con los nuevos medicamentos que se prescriben en cada transición asistencial, para resolver cualquier discrepancia y, de esta forma evitar omisiones, errores en la dosis, duplicidades y posibles interacciones.
- Asegurar que este proceso se realiza en cada transición a lo largo de la continuidad asistencial.
- Y que en todo momento esté disponible una lista completa, exacta y actualizada de la medicación para los profesionales que le atienden y para el paciente y cuidadores.
- El riesgo de error resulta ser mayor conforme aumenta el número de medicamentos que toman los pacientes y el número de patologías crónicas.

Para más información se puede consultar el boletín ISMP-España en el siguiente [enlace](#)

[Volver a INICIO](#)

3

IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ANTICONCEPTIVOS ORALES

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se informa que, por motivos de seguridad y para evitar errores de administración por parte de la usuaria, a partir del 12 de enero de 2024 **NO se permite** la sustitución en las farmacias de presentaciones de anticonceptivos de toma diaria y presentaciones de anticonceptivos con semana de descanso.

Es decir, un anticonceptivo cuya presentación sea de 28 o 84 comprimidos **NO podrá ser sustituido** por un anticonceptivo con idéntica composición y forma farmacéutica en presentaciones de 21 o 63 comprimidos, y viceversa. Sí se podrán sustituir entre sí los medicamentos anticonceptivos que pertenecen al mismo grupo DOE y que, por lo tanto, tienen idéntica composición, forma farmacéutica y presentación, en los supuestos que establece la normativa vigente. El sistema de receta electrónica ya no permite hacer dicha sustitución.

[Volver a INICIO](#)

4

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades del mes de enero de 2024:

Febrero 2024		
	Triple terapia inhalada para el asma	Trimbow® 87/5/9 mcg (Beclometasona/formoterol/bromuro de glicopirronio). Nueva indicación <u>financiada</u> *: tratamiento de mantenimiento del asma en adultos que no están adecuadamente controlados con una combinación de mantenimiento de un agonista beta2 de acción prolongada y una dosis media de corticoesteroide inhalado y que han experimentado una o más exacerbaciones asmáticas en el año anterior. * La indicación estaba autorizada desde agosto de 2022, pero no estaba financiada Enlace a Ficha Técnica

 Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

5

PUBLICACIONES DE INTERÉS

Boletín INFAC: Tratamiento farmacológico de la osteoporosis

Se ha publicado un nuevo número titulado “**Tratamiento farmacológico de la osteoporosis: la importancia de identificar la población de alto riesgo**”.

En él se revisan algunos aspectos del tratamiento farmacológico de la osteoporosis que resultan controvertidos como la eficacia, seguridad y duración de los tratamientos. También se valora el último fármaco comercializado (romosozumab).

Enlaces a los documentos:

- [Boletín](#)
- [Presentación](#)

Nuevo medicamento a examen: citisiniclina/citisina

Se ha publicado la ficha de evaluación de **citisiniclina/citisina** elaborada por el Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos (CENM) de Euskadi.

Enlace a documentos:

- [Ficha de evaluación](#)
- También se puede consultar información sobre la seguridad de este medicamento en el boletín de Farmacovigilancia de Cataluña en el siguiente [enlace](#).

Nueva infografía de SEFAP: ¿Quieres saber más sobre cómo manejar las infecciones en niños?

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha publicado una nueva infografía dirigida a pacientes y ciudadanía sobre el manejo de las infecciones en la población pediátrica.



Se puede consultar el documento en el siguiente [enlace](#)

Lista de medicamentos a evitar en 2024 (Revue Prescrire)

Como en años anteriores, la revista francesa *Revue Prescrire* ha publicado el informe del 2024 con la revisión de los medicamentos que deben evitarse, por tener una relación beneficio-riesgo desfavorable en las indicaciones para las que han sido autorizados en Francia o en la Unión Europea.

Para más información se puede consultar el informe en el siguiente [enlace](#)

Nuevas indicaciones de un fármaco alejadas de la indicación original ¿ventaja añadida?

Recientemente se ha publicado en la revista *Actualización en Medicina de Familia (AMF)* un interesante artículo en el que se recogen varios ejemplos de medicamentos diseñados para un objetivo que sin pretenderlo mejoran otro aspecto que no tenía aparente relación con la indicación inicial o son fruto de un efecto adverso no grave reconvertido en ventaja terapéutica como: finasterida, sildenafil, hidroxiclороquina, bimatoprost, semaglutida y otros agonistas del receptor GLP1.

Para más información se puede consultar el artículo en el siguiente [enlace](#)

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Adisocol® 150 mg comp (Ácido ursodeoxicólico)
- Adisocol® 450 mg 60 comp (Ácido ursodeoxicólico)
- Ciclochem® vaginal tubo de 40 g (Ciclopirox)
- Dagan® 10 mg 30 comp bucodispersables (Zolpidem)
- Dekristolan® 20.000 UI/ml 4 cápsulas (Colecalciferol)
- Duoxona EFG 30 mg/15 mg 56 comp lib. prolongada (Oxicodona/naloxona)
- Estradot® 37,5 microgramos/24 h. 8 parches transdérmicos (Estradiol)
- Eulitop retard® 400 mg 30 comp lib. prolongada (Bezafibrato)
- Eurartesim® 320 mg/ 40 mg 12 comp recubiertos con película (Piperaquina/artenimol)
- Flutox® 10 mg 20 comp recubiertos (Cloperastina)
- Foradil aerolizer® 12 mcg polvo 60 cápsulas (Formoterol fumarato)
- Intuniv® 2 mg 28 comp lib. prolongada (Guanfacina)
- Manidon retard® 120 mg 60 comp lib. prolongada (Verapamilo)
- Medebiotin Fuerte® 5 mg 10 ampollas sol. oral e inyectable (Biotina)
- Micetal® 10 mg/g polvo cutáneo tarro de 30 g (Flutrimazol)
- Nerdipina retard® 40 mg 60 cápsulas lib. controlada (Nicardipino)
- Otix® gotas óticas en solución frasco 5 ml (Trimetoprim/dexametasona/polimixina B)
- Oxicodona/naloxona Teva EFG 30 mg/15 mg 56 comp lib. prolongada (Oxicodona/naloxona)
- Oxynorm® 20 mg 28 cápsulas dura (Oxicodona)
- Sandostatin® 100 microgramos/ml solución inyectable y para perfusión 5 ampollas (Octeotrida)
- Siccafluid® 2,5 mg/g gel oftálmico, 30 y 60 unidosis 0,5 g (Carbomero)
- Solsint® 75 microgramos solución oral 30 envases unidosis (Levotiroxina)
- Suniderma® 0,127% crema, 30 g y 60 g (Hidrocloridato de cortisona)
- Taio Plus® 30 mg/15 mg 56 comp lib. prolongada EFG (Oxicodona/naloxona)
- Tanonalla EFG 30 mg/15 mg 56 comp lib. prolongada (Oxicodona/naloxona)
- Vasonase retard® 40 mg 60 cápsulas lib. controlada (Nicardipino)

RESTABLECIMIENTOS de suministro:


- Amchafibrin® 500 mg comp (Ácido tranexámico)
- Cibacen® 5 mg 28 comp (Benazepril)
- Fixaprost® 50 mcg/ml + 5 mg/ml colirios 30 envases unidosis de 0,2 ml (Latanoprost/timolol)
- Metoclopramida Kern Pharma® 1 mg/ml solución oral 250 ml (Metoclopramida)
- Metoclopramida Pensa® 1 mg/ml 250 ml (Metoclopramida)
- Molsidain® 2 mg comp (Molsidomina)
- Oftacilox® 3 mg/ml colirio solución 5 ml (Ciprofloxacino)
- Primperan® 1 mg/ml frasco 200 ml (Metoclopramida)
- Rocaltrol® 0,25 mcg 20 cápsulas (Calcitriol)
- Sandostatin LAR® 20 mg polvo vial (Octreotida)
- Surmenalit® 200 mg 30 comp (Salbutamina)
- Tranalex® 50 mg 28 comp (Naltrexona)
- Voltaren Retard® 75 mg 40 comp lib. modificada (Diclofenaco)
- Zinnat® 250 mg/5 ml frasco 50 ml (Cefuroxima)

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos.



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- [Tabla Desabastecimientos](#): En PRESBIDE se ha incorporado el botón “Desabastecimientos” que lleva a esta tabla directamente:



- En CIMA-AEMPS: [Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

7 INFOGRAFÍA VACUNA HERPES ZOSTER

En OSI Araba desde la farmacia de atención primaria se ha elaborado la siguiente infografía de la vacuna del Herpes Zoster en la que se resumen las características más importantes.

Para más información consultar el siguiente [enlace](#)

[Volver a INICIO](#)

8 CAMPAÑA MEJORA SEGURIDAD DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PEDIÁTRICOS EN FARMACIAS DE ÁLAVA

El Grupo de Seguridad del Paciente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava con la colaboración de la Unidad de Farmacia de OSI Araba ha puesto en marcha una campaña para promover el uso seguro de medicamentos en pediatría. El objetivo es emitir una serie de recomendaciones a los-as farmacéuticos-as orientadas a minimizar los errores en el proceso de dispensación y a mejorar la educación a padres, madres y cuidadores, aspectos que pueden contribuir a aumentar la seguridad en los tratamientos dirigidos a este grupo poblacional. Estas recomendaciones también han sido consensuadas con el Grupo de Seguridad de la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza.

La campaña se centra en tres tipos de medicamentos: antibióticos, antitérmicos y antitusivos y se desarrollará en las farmacias comunitarias en el momento de la dispensación durante la época invernal. Se informará de la correcta pauta posológica colocando unas pegatinas en los correspondientes envases, con la dosis y nombre del niño y recordando, en su caso, la manera de preparar el medicamento.

Para más información se puede consultar el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI ARABA
Farmacéuticos de Atención Primaria: Amaia Alzaga, Arantza Hernández, Javier Martínez e Inés San José

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza