



FARMAZIA – ARABAKO ESI-A
Lehen Mailako Farmazia

e-mail.: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

2024-ko Martxoa

MEDIKAMENTUEN SEGURTASUNA

- Flukonazola eta fetuarentzako balizko arriskuak haurdunaldian erabiltzen bada
- Oxikodona eta Oddiren esfinterraren disfuntzioa
- Pramipexola eta atsedunik gabeko zangoen sindromea handitzea

1

[Jarraitu irakurtzen](#)

NOBEDADEAK HELDUEN ETA HAURREN TXERTAKETA-EGUTEGIAN

- Aldaketa pneumokokoaren aurkako txertaketan arriskuko helduen artean
- Haurren txertaketa-egutegia aldatzea

2

[Jarraitu irakurtzen](#)

ARNAS BIRUS SINTZITALAREN (ABS) AURKAKO IMMUNIZAZIOA-KANPAINAREN AMAIERA EUSKADIN

3

[Jarraitu irakurtzen](#)

e-REZETAREN ETA LETONIAREN ARTEKO ELKARRERAGINGARRITASUNA

4

[Jarraitu irakurtzen](#)

HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN

5

[Jarraitu irakurtzen](#)

ARGITALPEN INTERESGARRIAK

- INFAC buletina: Bertigo periferikoaren tratamendu farmakologikoa. Zer kasutan?
- Medikamentuaren zentzuzko erabilerari buruzko oharra: Antibiotikoen erabilera arduratsua: Noiz ez preskribatu?
- i-botikako fitxa: Ke txarrak STOP
- SEFAPeKo infografia: Badakizu sendagaiek gidatzeko gaitasunean eragina izan dezaketela?

6

[Jarraitu irakurtzen](#)

MEDIKAMENTUEN HORNIDURA-GABEZIAK ETA BERREZARPENAK

7

[Jarraitu irakurtzen](#)

Flukonazola eta fetuarentzako balizko arriskuak haurdunaldian erabiltzen bada

Behaketa-azterlanek adierazten dute berezko abortua izateko arrisku handiagoa dagoela flukonazolekin tratatutako emakumeen artean haurdunaldiaren lehen eta/edo bigarren hiruhilekoan, flukonazolekin tratatu ez diren edo azol topikoekin tratatu diren emakumeen artean baino.

Haurdunaldian **flukonazola erabiltzearekin lotutako bihotz-malformazioei** buruz eskuragarri dauden azterlan epidemiologikoei emaitza kontraesankorrak ematen dituzte. **Bularreko haurren artean, sortzetiko anomalien** patroia bat deskribatzen dute kasuek amek haurdunaldian hiru hilabetez edo gehiagoz kokzidioimikusia tratatzeko flukonazol-dosi handia (400 eta 800 mg/egun artean) hartu bazuten. Flukonazolaren erabileraren eta sortzetiko anomalia horien arteko kausazko erlazioa zalantzarazkoa da.

Flukonazolekin tratamendua hasi aurretik, ugaltzeko adinean dauden emakumeei jakinarazi behar zaie fetuarentzat arriskutsua izan daitekeela. Dosi bakarreko tratamenduaren ondoren, aste bateko atsedenaldi farmakologikoa gomendatzen da (5-6 erdibizitzetara dagokiena), pazienteak haurdun geratu aurretik. Ugaltzeko adinean dauden emakumeen kasuan, tratamendu-ziklo luzeagoetarako, kontuan har daiteke metodo antisorgailuak erabiltzea tratamendu-aldi osoan eta azken dosia hartu eta astebetera.

Oxikodona eta Oddiren esfinterraren disfuntzioa

Oxikodonak Oddi esfinterraren disfuntzioa eta espasmoak eragin ditzake, eta, ondorioz, behazun-barneko presioa areagotu eta behazun-traktuaren eta pankreatitisaren sintomak izateko arriskua areagotu. Beraz, pankreatitisa eta behazun-traktuko gaixotasunak dituzten pazienteetan oxikodona kontuz administratu behar da.

Pramipexola eta atsedenik gabeko zangoen sindromea handitzea

Atsedenik gabeko zangoen sindromea handitzeko arriskua handitu egin daiteke pramipexol dosi altuenekin. Tratamenduari ekin aurretik, pazienteei jakinarazi behar zaie sintomak areagotu daitezkeela. Kasu horietan, dosia gutxieneko dosi eraginkorrera egokitze edo pramipexol bidezko tratamendua eteteko aukera aztertu behar da.

Informazio gehiago nahi izanez gero, AEMPSren hileko segurtasun-buletina kontsulta daiteke [esteka](#) honetan.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzak jakinarazi du 2024rako aldaketa hauek ezarriko direla gure autonomia-erkidegoan:

Aldaketa pneumokokoaren aurkako txertaketan arriskuko helduen artean

Duela gutxi jakinarazi da 23 eta 13 serotipotako txerto antineumokozikoen pauten ordean, **20 serotipoko txerto antipneumokoziko konjugatua** sartu dela arrisku-talde batzuetako helduen artean.

Txertaketa horren maneian sortu diren zalantzei erantzuteko, ohiko jardunean ematen diren hainbat egoera zehazten dira, bai eta horiei behar bezala heltzeko gomendioak ere.

- **VNC13 + VNP23 pauta sekuentzialaren ordeztu VNC20 txertoa jartzea**

Gomendatuta dago immunosupresioa, asplenia, kokleako inplanteak, LZR fistula, organo solidoaren transplantea, guraso hematopoietikoen transplantea, giltzurrun-gutxiegitasuna (4. eta 5. faseak) eta zirrosi hepaticoa duten pertsonentzat.

- **VNP23 txertoaren ordeztu VNC20 jartzea**

Gomendatuta dago giltzurrunetako gaixotasun kronikoa, gibelko gaixotasun kronikoa, diabetesa, gaixotasun kardiobaskularra eta BGBK duten pertsonentzat.

Ez da erakarpen aktiborik planteatzen, txertaketa oportunitate baizik. Indikazioa aurretik inolako txerto antipneumokokorik txertatu ez duten pertsonen zuzenduta dago.

Haurren txertaketa-egutegia aldatzea

Elgorria-Errubeola-Parotiditis-Barizelaren aurkako txerto tetrabirikoa erabiltzea antigeno horien bigarren dosia lau urterekin emateko haurren txertaketa-egutegian.

Informazio gehiago jakiteko, dokumentu hauek kontsulta ditzakezu:

- Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzaren oharra [esteka](#)
- 7. kapituluak: arriskuan dauden helduak txertatzea, Osasun Sailaren Txertaketen eta immunizazioen eskuliburuan, [esteka](#)

[HASIERA-ra Itzuli](#)

3

ARNAS BIRUS SINTZITIALAREN (ABS) AURKAKO IMMUNIZAZIOA-KANPAINAREN AMAIERA EUSKADIN

2023/2024 denboraldian, immunizazio-kanpaina funtsezko tresna izan da haurrak babesteko, bereziki arrisku-taldeak, haur goiztiarrak eta azpiko baldintza medikoak dituzten bularreko haurrak, ABSren infekzioarekin lotutako konplikazioetatik. Une honetan, arnas infekzio akutuen zaintzak positibo gutxi ematen du ABSren aurrean egindako proba diagnostikoetan, bai lehen mailako arretan artatutako pazienteen artean (% 0,0), bai ingratutako pazienteen artean (% 4,3).

ABSren zirkulazioa murriztu denez eta, ondorioz, infekzio-arriskua murriztu eta horniduren eskuragarritasuna mugatu direnez, **immunizazio-kanpaina 2024ko otsailaren 29an amaitu da.**

Nabarmentzekoa da, immunizazio-kanpaina amaitu den arren, ABSren zaintza epidemiologikoari eutsiko zaiola etengabe, eta arreta berezia jarriko zaiola neurriak berrikustea eska dezakeen edozein egoera-aldaketari.

Informazio gehiago nahi izanez gero, [esteka](#) hau kontsulta daiteke.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

4

e-REZETAREN ETA LETONIAREN ARTEKO ELKARRERAGINGARRITASUNA

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du martxoaren 4tik aurrera aktibatuta dagoela errezeta elektronikoen eta Letoniaren arteko elkarreragingarritasuna. Hemendik aurrera, Europako 7 herrialdeetan erabili ahalko da (Portugal, Kroazia, Txekiar Errepublika, Polonia, Estonia, Finlandia eta Letonia).

Euskadiko edozein egoiliarrek erabili ahal izango du errezeta elektronikoa (e-rezeta), herrialde horietan eta bere historia klinikora sartzeko edo farmazia-bulegoetan jasotzeko.

Elkarreragingarritasunari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, [esteka](#) hau kontsulta daiteke.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

5

HILABETEKO BERRITASUNAK ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUETAN

Hauek dira 2024ko martxoko berrikuntzak:

2024ko martxoa		
	Enpagliflozina	Jardiance 10 mg 28 konp. <u>Finantzatutako*</u> indikazio berria giltzurruneko gaixotasun kronikoa duten paziente helduenetara mugatuta (IGb >20 eta < 45 ml/min/1,73 m ² ; edo IGb > 45 eta 90 ml/min/1,73 m ² gernuan >200 mg/g <i>Kreatinina-albumina ratioarekin</i>), 2. motako DMrekin edo gabe, eta kontrolatuta ez badaude, nahiz eta lehen mailako terapien dosi egonkor optimizatuekin egin tratamendua (AEBI edo AHA II). * Giltzurrunetako gaixotasun kronikoa tratatzeko indikazioa baimenduta zegoen 2023ko abendutik, baina ez zegoen finantzatuta. Fitxa teknikorako esteka.
	Leuprorelina depot	Leuprorelina GP-PHARM® Depot mensual 3,75 mg, askapen luzeko bial 1. 2024ko apiriletik aurrera, Osasun Sistema Nazionalaren <u>finantzaketatik kanpo</u> eratuko dira haren indikazio GUZTIAK.
	Kodeina.	Codeisan® 1,26 mg/ml jarabe 250 ml-ko flaskoa. Estatuko Osasun Sistemaren <u>finantzaketatik baztertutako</u> aurkezpena.

 Indikazioa, finantzaketa edo preskripzio- eta dispentsazio-baldintzak zabaltzea

 Indikazioa, finantzaketa edo preskripzio- eta dispentsazio-baldintzak mugatzea

2020ko urtariletik aurrerako berritasunak jasotzen dituen dokumenturako [esteka](#)

[HASIERA-ra Itzuli](#)

6

ARGITALPEN INTERESGARRIAK

INFAC buletina: Bertigo periferikoaren tratamendu farmakologikoa

“Bertigo periferikoaren tratamendu farmakologikoa. Zer kasutan?” izeneko zenbaki berri bat argitaratu da.

Bertan, ebaluazioaren alderdi batzuk, zorabioaren eta bertigoaren arrazoiak, azpiko kausara bideratutako tratamendu espezifikoa eta errehabilitazio bestibularra aztertzen dira.

Dokumentuen estekak:

- [Buletina](#)
- [Aurkezpena](#)

Medikamentuaren zentzuzko erabilerari buruzko oharra: Antibiotikoen erabilera arduratsua

- Medikamentuaren zentzuzko erabilerari buruzko ohar berri bat argitaratu da: **“Antibiotikoen erabilera arduratsua: Noiz ez preskribatu?”**, horretan, antibiotikoak preskribatzea gomendatzen ez den infekzio batzuk adierazten dira.

[Esteka](#) honetan aurki daiteke dokumentua.

i-botikako fitxa: Ke txarrak STOP

Herritarren informazioari buruzko i-botikako fitxa berri bat argitaratu da, “Ke txarrak STOP” izenekoa. Bertan, zitisiniklinaren erabilerari buruzko informazioa ematen da.

[Esteka](#) honetan aurki daiteke dokumentua.

SEFAPeo infografia: Badakizu sendagaiek gidatzeko gaitasunean eragina izan dezaketela?

Lehen Mailako Arretako Farmazialarien Espainiako Sozietateak (SEFAP) medikamentuek gidatzeko gaitasunean duten arriskuei buruzko infografia berri bat argitaratu du, pazienteei eta herritarrei zuzenduta.



[Esteka](#) honetan aurki daiteke dokumentua.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Hona hemen hilabete honetako HORNIDURA-GABEZIARIk garrantzitsuenak:

- Aneuro[®] 5 mg/10 mg 20 konp estaliak (Diazepam/piridoxina)
- Aneuro[®] 5 mg/10 mg 50 konp estaliak (Diazepam/piridoxina)
- Equasym[®] 20 mg 30 askatze luzeko kapsula (Metilfenidato)
- Feldene[®] 20 mg/ml 1 ml-ko anpoilak (Piroxikam)
- Intuniv[®] 2 mg 28 askatze luzeko kapsula (Guanfazina)
- Lincocin[®] 500 mg 24 kapsula gogor (Linkomizina)
- Manidon retard[®] 180 mg 60 askatze luzeko konp (Berapamil)
- Oculotect[®] 50 mg/ml 10 ml-ko kolirioa (Pobidona)
- Metasedin[®] 5 mg 20 konp (metadona)

Metasedin® 5 mg 20 konprimatu medikamentuaren hornidurarik eza dela-eta, Osasun Sailak baimena eman du Metadona 5 mg 20 kapsuleko Formula Magistrala puntualki finantzatzeko, arazoa konpondu arte eta soilik errezeta elektronikoan (kodea: 140560).

HORNIDURA-BERREZARPENAK:


- Duoxona EFG 30 mg/15 mg 56 askatzeko luzeko konp (Naloxona/oxikodona)
- Duracef® 500 mg 28 kapsula (Cefadroxilo)
- Enoxaparina Rovi® 15.000 NU (150 mg) 30 xiringa sol. injektagarria 1 ml (Enoxaparina)
- Intuniv® 1 mg 28 askatze luzeko kapsula (Guanfazina)
- Kreon® 35.000 U 250 kapsula (Pankreatina)
- Manerix® 150 30 konp estaliak (Moklobemida)
- Oxikodona/Naloxona Teva® EFG 30 mg/15 mg 56 askatze luzeko konp (Oxikodona/naloxona)
- Oxynorm® 20 mg 28 kapsula gogor (Oxikodona)
- Renitecmax® 20/6 mg 28 konp (Enalapril/hidroklorotiazida)
- Taioma Plus® 30 mg/15 mg 56 askatze luzeko EFG konp (Oxikodona/naloxona)
- Tanonalla EFG 30 mg/15 mg 56 askatze luzeko konp (Oxikodona/naloxona)

PRESBIDEN «Hornikuntzarik eza» botoia eskuragarri dago, «Preskripzioen kontsulta» pantailaren beheko aldean, hornikuntzarik ezari buruzko informazio erabilgarriarekin.



Hornidura-gabeziak esteka honetan kontsulta daitezke.

- [Hornidura-gabezien taula](#): PRESBIDEN, zuzenean taula honetara daraman “Hornikuntzarik eza” botoia txertatua izan da.



CIMA-AEMPSen: [AEMPSen medikamentuak hornitzeko arazoak](#).

[HASIERA-ra Itzuli](#)

Lehen Mailako Arretako Farmazia

ARABako ESI-A: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

Farmazialariak: Amaia Alzaga, Arantza Hernández, Javier Martínez eta Inés San José



Argitalpen honen edukia Osakidetza Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da