



FARMACIA - OSI ARABA
Farmacia de Atención Primaria
[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Septiembre 2024	
INMUNIZACIÓN FRENTE A VRS EN LA TEMPORADA 2024-2025	1 Seguir leyendo
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2024-2025: GRIPE Y COVID-19	2 Seguir leyendo
ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE MONKEYPOX EN EUSKADI	3 Seguir leyendo
ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA VACUNACIÓN FRENTE AL VPH EN EUSKADI	4 Seguir leyendo
BOLETÍN DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DE LA AEMPS • Atorvastatina: administración concomitante con daptomicina y riesgo de miopatía y rabdomiólisis • Ceftazidima: reacciones adversas cutáneas graves • Hidroclorotiazida/nebivolol: interacción con antidiabéticos • Metotrexato: fotosensibilidad, interacción con metamizol y riesgo aumentado de efectos hematotóxicos • Minoxidil: hipertrichosis accidental	5 Seguir leyendo
NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA	6 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS • Guía de tratamiento clínico de la OMS para dejar de fumar en adultos • AEMPS: Boletín del Comité de Medicamentos de Uso Humano	7 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	8 Seguir leyendo
33. CONGRESO SALUD EN EUSKERA DE OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEA: BOTIKETATIK HARATAGO	9 Seguir leyendo

1	INMUNIZACIÓN FRENTE A VRS EN LA TEMPORADA 2024-2025
El Departamento de Salud ha incluido la inmunización de la población infantil con el anticuerpo monoclonal nirsevimab (Beyfortus®) para la próxima temporada de VRS 2024-2025, en la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave por VRS [<12 meses por prematuridad (<35 semanas de gestación) y <24 meses por morbilidad] e incorporando a la	

población sana nacida antes del inicio de la temporada de circulación de VRS (fecha de nacimiento entre el 01/07/2024 y 15/09/2024) y a la población que nazca durante la temporada de circulación actual de VRS (fecha de nacimiento entre el 16/09/2024 y 31/03/2025).

La campaña de inmunización se iniciará de forma simultánea para todos los grupos de población diana el 16 de septiembre de 2024.

Más información: [Nota informativa de la Dirección de Salud Pública en relación con la inmunización frente a VRS en la temporada 2024-2025](#)

[Volver a INICIO](#)

2

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TEMPORADA 2024-2025: GRIPE Y COVID-19

La Comisión de Salud Pública ha publicado el documento de *Actualización de recomendaciones de vacunación frente a la gripe y COVID-19* para la temporada de otoño-invierno (2024-2025). En la temporada 2023-2024 se observó una actividad gripal muy intensa en relación con las temporadas anteriores pre y posCOVID y un aumento de la tasa de hospitalización.

Como en años anteriores, la campaña de vacunación de este año tiene como objetivo principal reforzar la protección de las personas más vulnerables para reducir la morbilidad, así como disminuir el impacto de estas infecciones sobre la capacidad de atención sanitaria y sociosanitaria. Se prevé su inicio a partir de la última semana de septiembre y durante el mes de octubre.

Enlace al documento: [Actualización de recomendaciones de vacunación frente a la gripe y COVID-19](#)

[Volver a INICIO](#)

3

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE MONKEYPOX EN EUSKADI

En la [Nota informativa sobre la actualización de la situación de Monkeypox en Euskadi](#) (26 de agosto de 2024), remitida desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones se describen tanto la situación actual como medidas y recomendaciones con respecto a vacunación, vigilancia epidemiológica y, detección precoz y diagnóstico rápido.

[Volver a INICIO](#)

4

ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA VACUNACIÓN FRENTE AL VPH EN EUSKADI

En la [Nota informativa sobre la actualización de las recomendaciones para la vacunación frente al VPH en Euskadi](#) (septiembre de 2024), remitida desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones, se recomienda el cambio en la pauta de la vacunación de 2 dosis a 1 dosis en niños y niñas de 12 años, en el calendario de vacunación infantil del País Vasco. A su vez, se describe la estrategia de implantación de las nuevas recomendaciones de vacunación frente a VPH: en el calendario de vacunación infantil y campaña extraordinaria de captación hasta los 25 años, en personas pertenecientes a grupos de riesgo o por condiciones de salud y en mujeres, independientemente de su edad, con tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN2+).

[Volver a INICIO](#)

5

BOLETÍN DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO DE LA AEMPS

En el boletín mensual de seguridad de medicamentos de uso humano de la AEMPS, del 5 de agosto de 2024, se destaca la siguiente información procedente de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia:

Atorvastatina: administración concomitante con daptomicina y riesgo de miopatía y rabdomiólisis: Debe considerarse la suspensión temporal de atorvastatina en pacientes que estén tomando daptomicina. Si no es posible evitar la administración concomitante, se deben medir niveles de creatina cinasa (CK) 2-3 veces por semana, y monitorizar estrechamente a los pacientes para detectar cualquier signo o síntoma de miopatía.

Se añaden vasculitis y reacción liquenoide a atorvastatina, como reacciones adversas raras.

Ceftazidima: reacciones adversas cutáneas graves: Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves, incluidas síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos y pustulosis exantemática generalizada aguda. Estas reacciones pueden poner en peligro la vida o resultar mortales, y su frecuencia es desconocida.

Hidroclorotiazida/nebivolol: interacción con antidiabéticos: puede enmascarar algunos síntomas de hipoglucemia, como taquicardia y palpitaciones. Además, el uso simultáneo de betabloqueantes y sulfonilureas puede incrementar el riesgo de hipoglucemia grave.

Metotrexato: fotosensibilidad, interacción con metamizol y riesgo aumentado de efectos hematotóxicos: se ha observado fotosensibilidad, manifestada por una reacción exagerada de quemaduras en la piel. Debe evitarse exposición a luz solar intensa y a rayos UV, y utilizar protección solar adecuada.

La administración simultánea con metamizol puede aumentar el efecto hematotóxico del metotrexato, especialmente en pacientes de edad avanzada. Debe evitarse la coadministración.

Minoxidil: hipertrichosis accidental: en lactantes en contacto con las zonas de la piel donde los cuidadores se aplicaban minoxidil tópico, reversible en meses al dejar de estar expuestos. Debe evitarse el contacto con las zonas de aplicación de minoxidil.

Otras reacciones adversas identificadas después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia: entre otros, **Nimodipino:** hipoxia y **Tirzepatida:** disgeusia.

Para más información se puede consultar el boletín mensual de seguridad de la AEMPS publicado el 5 de agosto de 2024 en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

6

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades del mes de septiembre de 2024:

Septiembre 2024		
	Ác. Bempedoico	Nilemdo® 180 mg 28 comp. Nueva indicación, financiada: en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o de alto riesgo para reducir el riesgo cardiovascular al disminuir los niveles de C-LDL, como tratamiento complementario a la corrección de otros factores de riesgo:

		- en pacientes que toman la dosis máxima tolerada de una estatina con o sin ezetimiba o, - solo o en combinación con ezetimiba en pacientes que no toleran las estatinas o para los que estas están contraindicadas Enlace a Ficha técnica
	Ác. Bempedoico/ Ezetimiba	Nustendi® 180/10 mg 28 comp. Nueva indicación, financiada: en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o de alto riesgo para reducir el riesgo cardiovascular al disminuir los niveles de C-LDL, como tratamiento complementario a la corrección de otros factores de riesgo: - en pacientes que toman la dosis máxima tolerada de una estatina y no están adecuadamente controlados con el tratamiento adicional de ezetimiba, o - en pacientes que no toleran las estatinas, o para los que estas están contraindicadas, y no están adecuadamente controlados con el tratamiento de ezetimiba, o - en pacientes ya en tratamiento con ácido bempedoico y ezetimiba combinados en comprimidos separados Enlace a Ficha técnica
	Vacuna antineumocócica polisacárida conjugada (20-valente)	Prevenar 20® jeringa precargada. Nueva indicación <u>no incluida en la prestación farmacéutica del SNS</u> : inmunización activa para la prevención de la enfermedad invasiva, la neumonía y la otitis media aguda causadas por Streptococcus pneumoniae en lactantes, niños y adolescentes desde las 6 semanas hasta los menores de 18 años de edad. Prevenar 20® se debe utilizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales. Enlace a Ficha técnica
	Leflunomida	Arava® 10, 20 y 100 mg comp., leflunomida EFG 10 y 20 mg comp. A partir del 1 de octubre se suprime la necesidad de visado de los medicamentos que contienen leflunomida.

Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación.

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

7 PUBLICACIONES DE INTERÉS

GUÍA DE TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA OMS PARA DEJAR DE FUMAR EN ADULTOS

Esta guía proporciona orientación técnica sobre intervenciones para dejar de fumar, y para ayudar a los Estados Miembros de la OMS a utilizar intervenciones conductuales basadas en la evidencia y tratamientos farmacológicos para deshabituación tabáquica como parte de un enfoque integral de control del tabaco.

Más información: [WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults](#)

AEMPS: BOLETÍN DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

Se ha publicado el Boletín del Comité de Medicamentos de Uso Humano con fecha 7 de agosto de 2024, en el que se citan opiniones positivas para nuevos medicamentos y cambios de interés en medicamentos ya autorizados.

Enlace al boletín [aquí](#).

8

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Aldactacine® 25 mg/15 mg 40 comp. (espironolactona/altizida)
- Clotrimazol Gine-Canesmed® EFG 100 mg 6 comp. vaginales (clotrimazol)
- Fungisdin® 8,7 mg/ml sol. para pulv. cutánea, 1 frasco de 125 ml (miconazol)
- Retirides® 0,25 mg/g crema 30 g (tretinoína)
- Rifaldin® 300 mg 24 cap., Rimactan® 300 mg 60 cap. (rifampicina)
- Tarka® 180 mg/2 mg cap. liber. modif. 28 cap. (verapamilo/trandonapril)
- Tiaprizal® 100 mg sol. inyect. 12 ampollas de 2 ml (tiaprida)

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- Adisocol® 150 mg, 300 mg, 450 mg 60 comp. (ác. ursodeoxicólico)
- Amiodarona Aurovitas® EFG, Trangorex® 200 mg 30 comp. (amiodarona)
- Atenza®, Concerta®, Metilfenidato Sandoz® EFG, Rubicrono EFG® 27 mg, 54 mg y Metilfenidato Tecnigen®, Viatris® EFG 54 mg 30 comp. lib. prolong. (metilfenidato)
- Atorduo® 10 mg/10 mg 30 cap., Ezetimiba/atorvastatina Teva® 10 mg/10 mg 30 comp. recub. (atorvastatina/ezetimiba)
- Braltus® 10 mcg 30 cap. para inhal. + inhalador Zonda (tiotropio bromuro)
- Feliben® 52,5 mcg/h 5, 10 parches transderm., 70 mcg/h 5 parches transderm. (buprenorfina)
- Hepaxane® 15.000 UI (150 mg) 30 jer. precarg. sol. inyect. 1 ml (enoxaparina)
- Manidon retard® 120 mg 60 comp. lib. prolong. (verapamilo)
- Semglee® 100 unidades/ml sol. inyect. 5 plumas precarg. 3 ml (insulina glargina)
- Sotapor® 80 mg 30 comp. (sotalol)
- Sumatriptan Aurovitas® EFG 50 mg 4 comp., Sumatriptan Viatris® EFG 50 mg 4 comp. recub. (sumatriptan)

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos.



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- PRESBIDE; [Tabla de desabastecimientos de medicamentos.](#)
- CIMA-AEMPS; [Acceso a listado de medicamentos con problemas de suministro](#)

Desde Osasungoa Euskalduntzeko Erakundea han organizado “33. Osasun Biltzarra: botiketarik haratago” (en euskera), que tendrá lugar el 25 de octubre en Zornotza y han ampliado el plazo para la presentación de comunicaciones y pósteres hasta el 20 de septiembre.

Programa y carta de presentación disponible en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

Servicio de Farmacia – OSI ARABA

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba

Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José y María Prieto.

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza

Los boletines FarmaHitzak se pueden consultar en la Intranet de Osakidetza en el siguiente [enlace](#)