



FARMACIA - OSI ARABA
Farmacia de Atención Primaria
[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Enero 2025	
LA AEMPS ACTUALIZA LA SITUACIÓN DE SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS ANÁLOGOS DEL GLP-1	1 Seguir leyendo
NUEVA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	2 Seguir leyendo
RECOMENDACIONES PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA	3 Seguir leyendo
AEMPS: BOLETÍN DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO	4 Seguir leyendo
NOVEDADES EN PRESBIDE Medicamentos extranjeros en e-rezeta	5 Seguir leyendo
PUBLICACIONES DE INTERÉS - NICE: recomendaciones y recursos para el manejo del asma - BMJ: riesgo de demencia asociado con fármacos anticolinérgicos para vejiga hiperactiva en adultos mayores de 55 años - SPS: elección de medicamentos en dificultades de deglución	6 Seguir leyendo
DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Desabastecimiento de metilfenidato comprimidos de liberación prolongada	7 Seguir leyendo

1	LA AEMPS ACTUALIZA LA SITUACIÓN DE SUMINISTRO DE LOS MEDICAMENTOS ANÁLOGOS DEL GLP-1
----------	---

Con fecha 9 de diciembre de 2024, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha actualizado la situación de suministro de los medicamentos análogos de GLP-1. Continúa realizando un estrecho seguimiento del suministro de estos medicamentos en el mercado, e insiste en la necesidad de ajustarse a las indicaciones recogidas en sus Fichas Técnicas.

Por otra parte, el laboratorio Novo Nordisk tiene previsto que el medicamento Victoza® 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada (liraglutida), utilizado para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, cese su comercialización a finales del año 2025, por lo que se recomienda que se tenga en cuenta a la hora de iniciar nuevos tratamientos y en el mantenimiento de los ya iniciados.

También se recuerda que se han incorporado al mercado otros medicamentos (Wegovy®-semaglutida- y Mounjaro®-tirzepatida-) como no financiados y que incluyen en sus Fichas Técnicas la indicación del control de peso combinado con dieta saludable y ejercicio físico, en casos de obesidad o sobrepeso con comorbilidades asociadas.

Más información disponible en este [enlace](#)

[Volver a INICIO](#)

2

NUEVA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Dentro del portal [GuiaSalud](#) se ha publicado la “[Guía de Práctica Clínica para el tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada \(TAG\) en Atención Primaria](#)”, elaborada por el [Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud](#). Actualiza parcialmente un documento previo de 2008 que abordaba el diagnóstico y tratamiento del TAG y el trastorno de angustia, con o sin agorafobia, incorporando los nuevos avances en el tratamiento del TAG.

Proporciona recomendaciones actualizadas, desarrolladas de forma sistemática y basadas en la mejor evidencia científica disponible, para ayudar a los profesionales implicados y a los pacientes a tomar decisiones sobre las opciones terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar este problema de salud.

El objetivo de esta Guía es reducir la variabilidad en la práctica clínica, mejorar la coordinación con la atención especializada en salud mental y mejorar la calidad asistencial prestada a estos pacientes y su calidad de vida.

[Volver a INICIO](#)

3

RECOMENDACIONES PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA

Recientemente se ha publicado un documento de “[Recomendaciones para el uso seguro de los medicamentos de alto riesgo en pediatría](#)” por el Ministerio de Sanidad.

En los pacientes pediátricos confluyen una serie de factores específicos que hacen que los errores de medicación sean más frecuentes que en adultos y que el riesgo de que estos errores causen eventos adversos sea mayor.

El documento proporciona una lista de referencia de los medicamentos de alto riesgo en pacientes pediátricos, incide en la necesidad de que los centros desarrollen e implementen programas de mejora de la seguridad de estos medicamentos, recoge las prácticas generales de seguridad que se aconseja implantar para prevenir los errores, describe los más frecuentes y las prácticas específicas para los siguientes grupos farmacológicos o medicamentos de alto riesgo: agonistas adrenérgicos IV, antibióticos aminoglucósidos, anticoagulantes orales, heparinas y otros anticoagulantes parenterales, bloqueantes neuromusculares, insulinas, medicamentos para sedación moderada y mínima, nutrición parenteral, opioides, metotrexato (uso no oncológico), paracetamol IV, potasio IV y vancomicina.

[Volver a INICIO](#)

En el boletín mensual de seguridad de medicamentos de uso humano de la AEMPS del 20 de diciembre de 2024, se destaca la siguiente información procedente de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia:

Antagonistas de los receptores de angiotensina II (olmesartán, irbesartán, valsartán, losartán, candesartán, eprosartán y telmisartán), solos o en combinación: se han notificado casos de angioedema intestinal. Los pacientes presentaron dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, que desaparecieron tras la interrupción del tratamiento. Si se diagnostica angioedema intestinal, suspender el tratamiento y vigilar hasta resolución completa de los síntomas.

Se añade el angioedema intestinal como una reacción adversa de frecuencia rara en losartán, olmesartán e irbesartán y de frecuencia muy rara en valsartán y candesartán. También se incluye una advertencia sobre este riesgo en las Fichas Técnicas de otros ARA-II como eprosartán y telmisartán.

Bilastina: se han notificado casos de prolongación del intervalo QT. Se recomienda precaución en pacientes que tienen un mayor riesgo (pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas, pacientes que presentan hipopotasemia, hipomagnesemia o hipocalcemia, pacientes con prolongación conocida del intervalo QT o bradicardia significativa, así como pacientes con administración concomitante de otros medicamentos asociados con la prolongación del intervalo QT/QTc).

Espironolactona: puede reducir los niveles plasmáticos de mitotano en pacientes con carcinoma corticosuprarrenal. No se deben utilizar simultáneamente ambos medicamentos.

Lantano: contraindicado en los sujetos con obstrucción intestinal en curso.

Paracetamol/clorfenamina maleato: paracetamol debe administrarse con precaución en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), porque puede provocar metahemoglobinemia y anemia hemolítica.

Además, se añade que una sobredosis de paracetamol puede provocar coagulación intravascular diseminada.

Vardenafilo: se han notificado casos de síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET) de la piel, que pueden ser potencialmente mortales. Si aparecen signos o síntomas que sugieran estas reacciones, interrumpir inmediatamente el tratamiento y no reiniciarlo en ningún momento.

Se añaden el SSJ y la NET como reacciones adversas de frecuencia no conocida.

Además, se añade la coriorretinopatía serosa central como reacción adversa de frecuencia no conocida.

Para más información se puede consultar este boletín mensual de seguridad de la AEMPS en el siguiente [enlace](#).

[Volver a INICIO](#)

Medicamentos extranjeros en e-rezeta

Se han incluido en e-rezeta los siguientes códigos de principios activos (Denominación Oficial Española-DOE) de algunos medicamentos extranjeros, para que puedan ser prescritos electrónicamente en Presbide:

Código	Denominación del medicamento en Presbide
148000	M EXTRANJERO TRIFLUOPERAZINA 5 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
148001	M EXTRANJERO ETOSUXIMIDA 50 MG/ML SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN ORAL 200ML 1 FRASCO
148002	M EXTRANJERO FENOXIBENZAMINA 10 MG 100 CÁPSULAS
148003	M EXTRANJERO UBIDECARENONA 50 MG 14 CÁPSULAS
148004	M EXTRANJERO UBIDECARENONA 50 MG/10ML SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN ORAL 10 VIALES
148005	M EXTRANJERO DAPSONA 50 MG 50 COMPRIMIDOS
148006	M EXTRANJERO METOXALENO 10 MG 30 COMPRIMIDOS

La prescripción de estos medicamentos es meramente informativa, serán visibles en farmacia comunitaria, pero no dispensables. El paciente seguirá recogiendo el medicamento, como se hace hasta ahora, en la Delegación Territorial del Dpto. de Salud de Álava (C/ Olaguibel, 38 bajo. Vitoria-Gasteiz).

Para estos medicamentos, ya no es necesario llevar la receta médica manuscrita para recoger la medicación, como se venía haciendo hasta ahora.

[Volver a INICIO](#)

6 PUBLICACIONES DE INTERÉS

NICE: recomendaciones y recursos para el manejo del asma

Se ha publicado la Guía Clínica que recoge recomendaciones y recursos de la *British Thoracic Society (BTS)*, el *National Institute for Health and Care Excellence (NICE)* y el *Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)* sobre el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento del asma en adultos, jóvenes y niños.

Se puede acceder a la publicación a través de este [enlace](#).

BMJ: riesgo de demencia asociado con fármacos anticolinérgicos para vejiga hiperactiva en adultos de ≥55 años

Un estudio caso-control anidado publicado recientemente en BMJ observó el consumo acumulado de diferentes fármacos anticolinérgicos utilizados para el tratamiento de vejiga hiperactiva, en un período de 3 a 16 años antes de un diagnóstico de demencia. El 62,6% de la población de estudio fueron mujeres y la media de edad 83 años.

El artículo concluye que, de los diferentes fármacos anticolinérgicos utilizados para tratar la vejiga hiperactiva, se encontró que oxibutinina, solifenacina y tolterodina estaban asociados más fuertemente con el riesgo de demencia en adultos mayores.

Se puede acceder a la publicación a través de este [enlace](#).

SPS: elección de medicamentos en dificultades de deglución

Specialist Pharmacy Service (SPS) ha publicado el 17 de diciembre de 2024 una serie de recomendaciones para la elección correcta de medicamentos en pacientes con dificultades para la deglución: 6 pasos que describen los factores a tener en cuenta a la hora de elegir las presentaciones adecuadas.

Se puede acceder a la publicación a través de este [enlace](#).

Se recuerda que también están disponibles otros recursos relacionados con dificultades de deglución y/o adaptación de formas farmacéuticas como la aplicación [Deglufarm](#) o el boletín INFAC [Administración de medicamentos orales: ¿cómo y cuándo?](#)

[Volver a INICIO](#)

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Aproxxamlo® 300 mg/10 mg 30 comp. recubiertos con película (irbesartán, amlodipino)
- Celestone cronodose® 2 ml 1 vial (betametasona)
- Clarelux® 500 mcg/g espuma cutánea 1 envase a presión de 100 g (clobetasol)
- Fosrenol® 750 mg 90 comp. masticables (lantano carbonato)
- Gonapeptyl depot® 3,75 mg 1 jeringa precargada + 1 jeringa precargada de disolvente (triptorelina)
- Menaderm otológico® 0,25 mg/ml + 10 mg/ml gotas óticas en solución 1 frasco 10 ml (beclometasona/clioquinol)
- Tiaprizal® 100 mg 24 comp. (tiaprida)
- Zubsolv® 1,4 mg/0,36 mg y 2,9 mg/0,71 mg, 7 y 28 comp. sublinguales (buprenorfina/ naloxona)

Desabastecimiento de metilfenidato comprimidos de liberación prolongada

La AEMPS, con fecha 19 de diciembre de 2024, ha publicado una nueva [Actualización de la situación de suministro de medicamentos que contienen como principio activo metilfenidato en forma de comprimidos de liberación prolongada](#).


En esta actualización se indica que los laboratorios de Atenza® y Concerta® han confirmado la disponibilidad de un mayor número de unidades para el año 2025, para garantizar el restablecimiento del suministro con normalidad.

Actualmente, el suministro todavía no está totalmente restablecido, por lo que sigue existiendo la posibilidad de adquirir la medicación como medicamento extranjero. Los usuarios deberán acudir con la TIS original y tarjeta bancaria a la Delegación Territorial del Dpto. de Salud de Álava (C/ Olaguibel, 38 bajo. Vitoria-Gasteiz). Es importante confirmar previamente la disponibilidad de la presentación necesaria según dosis prescrita, evitando así desplazamientos innecesarios.

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- Abipol® 5 mg 28 cáp. (aripiprazol)
- Acarbosa Tecnigen® 50 mg 100 comp. (acarbosa)
- Cholestagel® 625 mg 180 comp. recubiertos con película (colesevelam hidrocloreto)
- Ciclochem® vaginal 1 tubo de 40 g (ciclopirox)
- Dagan® EFG 5, 10 mg 30 comp. bucodispersables (zolidem)
- Tofranil® 25 mg 50 comp. recubiertos (imipramina)
- Gabapentina Teva® EFG 100 mg 90 cáp. duras (gabapentina)
- Insucor® 2,5 mg 28 comp. (nebivolol)
- Jorveza® 0,5 y 1 mg 60 comp. bucodispersables (budesonida)
- Pecfent® 400 mcg/pulv. solución para pulverización nasal 8 dosis, 1 y 4 envases (fentanilo citrato)
- Retirides® 0,25 mg/g crema 1 tubo 30 g (tretinoína)
- Sandostatin® 100 mcg/ml solución inyectable y para perfusión, 5 ampollas de 1 ml y Sandostatin Lar® 20 mg 1 vial polvo para suspensión inyectable + 1 jeringa disolvente + 1 aguja (octreotida)
- Tofranil® 25 mg 50 comp. recubiertos (imipramina)
- Trulicity® 0,75 mg solución inyectable c/4 plumas (dulaglutida)
- Zyprexa® 10 mg polvo para solución inyectable, 1 vial (olanzapina)

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos.



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- PRESBIDE; [Tabla de desabastecimientos de medicamentos.](#)
- CIMA-AEMPS; [Acceso a listado de medicamentos con problemas de suministro](#)

[Volver a INICIO](#)

Unidad de Farmacia de Atención Primaria – OSI Araba
Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José y María Prieto

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a la siguiente dirección:
farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza
Los boletines FarmaHitzak están disponibles en la INTRANET de Osakidetza en el siguiente [enlace](#)

