



FARMAZIA – ARABAKO ESI-A

Lehen Mailako Arretako Farmazia

e-mail.: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus

2026ko Otsaila

AEMPS • Parasetamolaren nahigabeko gaindosia izateko arriskua aho bidezko soluzioetan • Arixtra® sendagaian kalitate-akatsa eta hartu beharreko neurriak • Giza erabilerarako medikamentuen segurtasun-buletinak	1 Jarraitu irakurtzen
RYBELSUS® ETA OZEMPIC® AURKEZPEN BERRIAK MERKATURATZEA	2 Jarraitu irakurtzen
VICTOZA® MERKATURATZEARI UTZI DIOTE	3 Jarraitu irakurtzen
ERRIBAROXABAN MEDIKAMENTU GENERIKOEN PRESKRIPZIOA	4 Jarraitu irakurtzen
GERNUBIDEETAKO INFEKZIOARI BURUZKO ELKARLANEKO GIDAREN EGOERAREN INGURUKO JAKINARAZPENA	5 Jarraitu irakurtzen
ALERTA, OXIDO NITROSOAREN ETA TROPIKAMIDA-KOLIRIOAREN ERABILERA LUDIKOAGATIK	6 Jarraitu irakurtzen
ARGITALPEN INTERESGARRIAK • EAEko Farmakozaintzako buletina (62. zk.) • INFAC buletin berria: Tabakismoaren kontrako tratamendu farmakologikoa • Osasun Sistema Nazionalaren PRAN gida terapeutikoa: paziente pediatrikoen goiko arnasbideetako infekzioei buruzko kapituluaren eguneratzea • BOLCAN: Migrainaren maneiu integrala	7 Jarraitu irakurtzen
ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUEN INGURUKO HILEKO BERRIAK	8 Jarraitu irakurtzen
MEDIKAMENTUEN HORNIDURA-GABEZIAK ETA - BERREZARPENAK	9 Jarraitu irakurtzen

1

AEMPS

Parasetamolaren nahigabeko gaindosia izateko arriskua aho bidezko soluzioetan

Biztanleria pediatrikoan, parasetamolaren **nahi gabeko gaindosiarekin** lotutako ondorio kaltegarri larrien bi kasu agertu dira, aho bidezko soluzioa erabilita.

Pazienteen jatorrizko herrialdean xarabeek hemen merkaturatutakoek ez bezalako kontzentrazioa zutelako sortu zen nahasmena.

Gomendatutakoak baino dosi handiagoak emateak ondorio larriak izan ditzake, beraz, hori gertatzen bada, **pazienteak arreata medikoa jaso behar du, sintomarik ez badu ere.**

Medikazio-akatsak saihesteko ezinbestekoa da **parazetamol-dosia** medikamentuaren kontzentrazioaren eta pazientearen pisuaren arabera **doitzea**.

[Informazio-oharra, osorik](#)

Arixtra® sendagaien kalitate-akatsa eta hartu beharreko neurriak

Arixtra®-ko hainbat xiringa aurrekargaturen orratzaren **kolore-aldaketarekin eta balizko buxadurarekin lotutako kalitate-akats baten berri eman du**. Akats horrek sendagaiaren edozein lote eta aurkezpeni eragin diezaioke. Kaltetutako xiringa bat erabiltzeak izan ditzakeen arriskuak saihesteko, sendagai hori eman edo eman aurretik, arretaz aztertu behar da orratzaren oinarrian kolore-aldaketa bat detektatzeko, eta, hautemanenez gero, ez da banatu edo eman behar, eta itzuli egin behar da.

[Informazio-oharra, osorik](#)

Giza erabilerarako medikamentuen segurtasun-buletinak

2025eko abenduan, [Giza erabilerarako medikamentuen segurtasun-buletina \(2025eko urria\)](#) argitaratu zen, eta, 2026ko urtarrilean, [Giza erabilerarako medikamentuen segurtasun-buletina \(2025eko azaroa\)](#), farmakozaintza-datuen aldizkako ebaluaziotik ateratako segurtasun-informazio berriarekin.

Urrian ebaluatutako medikamentuen artean, honako hauek nabarmentzen ditugu:

- **Amlodipinoa/atorbastatina** – Daptomizinarekiko interakzioa
- **Atenolola** – Sulfonilurearekiko interakzioa
- **Kodeina** – Opioideen kontsumoagatiko nahasmendua, loaren apnea, hiperalgesia, gabapentinoideekiko interakzioa, asaldura hepatobiliarrak
- **Gabapentina** – Miastenia larria, abstinentzia
- **Prednisona** – Aldizkako paralisi tirotoxikoa
- **Trimetoprima** – Larruazaleko erreakzio larriak

Azaroan ebaluatutako medikamentuen artean, hauek nabarmentzen dira:

- **Klomipramina** – Kataplexia eta asaldura kardiakoak
- **Klozapina** – Prozesu hematologiko gaiztoak (PHM), DRESS sindromea, balproikoarekiko interakzioa eta apendizitisa
- **Kodeina/parazetamola** – Opioideen kontsumoagatiko nahasmendua, loaren apnea, hiperalgesia, gabapentinoideekiko interakzioa, asaldura hepatobiliarrak
- **Metoprolola** – Sulfonilurearekiko interakzioa
- **Errifanpizina** – Interakzioak eta erreakzio paradoxikoa
- **Selegilina** – Sindrome serotoninergikoa eta bulkadak kontrolatzeko nahasmenduak
- **Azido tranexamikoa** – Giltzurrunetako erreakzioak, medikamentuaren ondoriozko erupzio finkoa eta akatsak ematean.
- **Barizelaren txertoa (Varilrix®)** – Emateko gomendio batzuk kendu dira.

Rybelsus® (aho bidezko semaglutida) eta Ozempic® (larruazalpeko semaglutida) merkaturatzen dituen laborategiak jakinarazi duenez, sendagai horien aurkezpen berriak merkaturatu dira eta aurreko aurkezpenak merkaturatzeari utziko diote.

Rybelsus® medikamentuaren ohiko konprimatuen ordezt, bioeskuragarritasun handiagoko formulazioa duten konprimatuak emango dira, nahiz eta hasierako formulazioarekin biobaliokideak izan, taula honetan jasotzen den moduan:

Hasierako formulazioa (konprimatu obalatua)	Biobaliokidea	Formulazio berria (konprimatu borobila)
3 mg (hasierako dosia)	=	1,5 mg (hasierako dosia)
7 mg (mantentze-dosia)	=	4 mg (mantentze-dosia)
14 mg (mantentze-dosia)	=	9 mg (mantentze-dosia)

Hasierako formulazioarekin alderatuta, formulazio berriaren eszipienteeak aldatu egin dira, xurgapena areagotzeko. Formulazio berriak bioerabilgarritasuna handitu du, eta, beraz, dosi txikiagoak eman behar dira farmakoarekiko esposizio berbera lortzeko.

Trantsizio-aldian bi formulazioak egoteak nahasteak sor ditzake, eta horrek **medikazio-akats**erako arriskua ekar dezake.

Laburbilduz:

- Rybelsus® medikamentuaren ohiko konprimatuen ordezt, bioeskuragarritasun handiagoko formulazioa duten konprimatuak emango dira, nahiz eta hasierako formulazioarekin biobaliokideak izan
- Formulazio berriak hasierako formulazioaren eraginkortasun, segurtasun eta forma berberak dauzka.
- Rybelsus® konprimatu bat hartu behar da egunean.
- Denbora batez, bi formulazioak aldi berean egongo dira merkatuan, eta horrek nahasteak sorraraz ditzake. Horren ondorioz, gaindosiak gerta litezke, eta, beraz, gertakari kaltegarrietarako arriskua handituko da.
- Gaur egun Rybelsus® hartzen duten pazienteei formulazioan eta dosian izandako aldaketari buruzko informazioa eta aholkua eman beharko zaizkie, formulazio berria preskribatzen edo ematen zaienean.
- Rybelsus® tratamendua hasten duten pazienteei formulazio berria eman beharko zaie, eta medikuak edo farmazialariak informazio egokia eman beharko die.


Informazio-gutuna

Ozempic®-i dagokionez, aurkezpen berriak taula honetan laburbiltzen dira:

EGUNGO AURKEZPENAK	AURKEZPEN BERRIAK	ALDAKETAK AURKEZPEN BERRIAN
Ozempic® 0,25 mg aurrez kargatutako luman injektatzeko disoluzioa, 1,5 ml-ko aurrez kargatutako luma 1 + erabili eta botatzeko 4 orratz	ALDAKETARIK GABE	ALDAKETARIK GABE
Ozempic® 0,5 mg aurrez kargatutako luman injektatzeko disoluzioa, 1,5 ml-ko aurrekargatutako luma 1 + erabili eta botatzeko 4 orratz	Ozempic® 0,5 mg aurrez kargatutako luman injektatzeko disoluzioa, 3 ml -ko aurrekargatutako luma 1 + erabili eta botatzeko 4 orratz	Luma berria (3 ml, 1,5 ml-ren ordezt)
Ozempic® 1 mg aurrez kargatutako luman injektatzeko disoluzioa, 3 ml-ko aurrekargatutako luma 1 + erabili eta botatzeko 4 orratz	Ozempic® 1 mg aurrez kargatutako luman injektatzeko disoluzioa, 3 ml-ko aurrekargatutako luma 1 + erabili eta botatzeko 8 orratz	8 dosi barne 4 izan beharrean

Era berean, Rybelsus® eta Ozempic® aurreko eta egungo aurkezpenen [fitxa bateratu bat](#) zabaldu du.

Presbiden, eten behar diren aurkezpenak "Aldaketa/Luzapena/Bistaratzeta" aukeran bakarrik daude eskuragarri, eta aurkezpen berriak "Preskripzioaren hasiera" eta "Aldaketa/Luzapena/Bistaratzeta" aukeretan daude. Gainera, aurkezpenak hautatzean, agertzen ari diren oharrak agertzen dira azalpenezko PDF dokumentu baterako esteka batekin, jarraian ikus daitekeen bezala:



[HASIERA-ra Itzuli](#)

3 VICTOZA® MERKATURATZEARI UTZI DIOTE

2025eko abenduaren 31n, medikamentu hau merkaturatzeari utzi zioten: Victoza® 6 mg/ml, aurrez kargatutako 2 lumatan injektatzeko soluzioa, 3 ml. Preskripzio hori Presbiden bistaratzean, abisu emergente bat agertzen da. Urtarrilean, Victoza® medikamentuaren bioantzeko medikamentu bati eman zaio alta, nahiz eta oraindik ez den adierazi noiz merkaturatuko den.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

4 ERIBAROXABAN MEDIKAMENTU GENERIKOEN PRESKRIPZIOA

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak adierazi duenez, 2026ko urtarrilaren 21etik aurrera Nomenclator-en sartutako eribaroxaban medikamentu generikoak bere kargura eman eta fakturatu ahalko dira.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

5 GERNUBIDEETAKO INFEKZIOARI BURUZKO ELKARLANEKO GIDAREN EGOERAREN INGURUKO JAKINARAZPENA

Gernubideetako infekzioari buruzko elkarlaneko gidaren egoerari buruz, Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak adierazi du Presbiden **behin-behinean blokeatu** dela horretarako ziurtatutako erizainek gidan sartuta dauden bi medikamentu hauek agintzeko aukera: fosfomizina trometamola eta nitrofurantoina.

Etenaldiak medikamentu horiei bakarrik eragiten die, *Erizainek jarduteko protokoloa: emakumeen gernu-sintomak* protokoloaren ezarpenak indarrean jarraitzen baitu.

Neurriak ez du eraginik izan orain arte ezarri diren elkarlaneko gainerako gidetan (tabakoa uztekoetan, adibidez), eta prozesu asistentzialaren funtzionamenduak orain arte bezala jarraituko du.

[Osakidetzaren oharra](#)

[HASIERA-ra Itzuli](#)

6

ALERTA, OXIDO NITROSOAREN ETA TROPIKAMIDA-KOLIRIOAREN ERABILERA LUDIKOAGATIK

Medikamentuak erabilera ludikorako erabiltzeak, osasun-langile batek agindu eta preskribatu gabe, besteak beste euforia- edo haluzinazio-efektua lortzeko, osasun publikoko arazo bat eragin dezake.

Hori dela-eta, Drogen eta Adikzioen Espainiako Behatokiak (OEDA) [oxido nitrosoaren](#) (barrearen gasa) jolas-erabilerarekin eta [tropikamida-kolirioaren](#) erabilera ez-medikoarekin lotutako intoxikazioei buruzko informazioa argitaratu du [SEAT Alertak](#) (Alerta Goiztiarraren Espainiako Sistema) atalean.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

7

ARGITALPEN INTERESGARRIAK

EAEko Farmakozaintzako Buletin berria

[EAEko Farmakozaintzako 62. Buletina](#) argitaratu da. Jorratzen dituen gaien artean, hauek nabarmentzen dira:

- Antibiotikoak eta neurotoxikotasuna
- Medikamentuei buruzko oharra: Medikamentuarekiko interakzioagatiko angioedema
- Fitxa teknikoak eguneratzea, segurtasun-arrazoiak direla-eta. Farmakozaintzako Arriskuen Ebaluaziorako Europako Batzordearen gomendioak



Farmakozaintzako aurreko buletinak [esteka](#) honetan kontsultatu daitezke.

INFAC buletin berria: Tabakismoaren kontrako tratamendu farmakologikoa

“Tabakismoaren kontrako tratamendu farmakologikoa” izeneko zenbaki berri bat argitaratu da.

2020an argitaratutako “Tabakoa erretzeari uzteko farmakoak finantzatzea” buletina eguneratzea da buletin horren helburua.

Dokumentuetarako estekak:

- [Buletina](#)
- [2. taula](#)
- [3. taula](#)

Osasun Sistema Nazionalaren PRAN gida terapeutikoa: paziente pediatrikoen goiko arnasbideetako infekzioei buruzko kapituluaren eguneratzea

Osasun Sistema Nazionalaren PRAN gida terapeutikoa, [paziente pediatrikoen goiko arnasbideetako infekzioei buruzko kapitulua](#) eguneratu da (2025eko eguneratzea).



Migrainaren maneiu integrala

Kanarietako Osasun Sistemaren medikamentuen erabilera arrazionalari buruzko buletin kanariarrak (BOLCAN), 2025eko abenduak [argitalpenean](#), "Migrainaren maneiu integrala" berrikusi zuen.

[HASIERA-ra Itzuli](#)

8

ERREZETA BIDEZ PRESKRIBATZEN DIREN MEDIKAMENTUEN INGURUKO HILEKO BERRIAK

Hauek dira otsailako berrietasunak:

2026ko otsaila		
	Midazolama	Oroxelam® 10 mg xiringa ahotik erabiltzeko, 2 ml ahotik hartzeko. Finantzatutako indikazioaren* hedapena. Honela geratuko da: - Konbultsio-krisi akutua eta luzeen tratamendua bularreko haurretan, 3 hilabetetik helduetara. Oroxelam® soilik gurasoek/zaintzaileek erabili behar dute pazienteari epilepsia diagnostikatu zaionean. 3-6 hilabete bitarteko bularreko haurretan, pazientea monitorizatu daitekeen eta bizkortze-taldea duen ospitale batean eman behar da tratamendua. Fitxa teknikorako esteka.
	Zitisiniklina	Recigarum® 1,5 mg/ahotik hartzeko disoluzio-dosi bakoitzeko, 22 ml-tako ontzia (100 dosi). Erretzeari uzteko prest dauden erretzaile helduentzat, tabakoaren mendekotasuna tratatzeko eta nikotinarekiko mendekotasunaren antsietatea murrizteko. Fitxa teknikorako .
	Zianocobalamina	Becaren® 1000 mcg konp. Helduentzat: - B12 bitaminaren eskasia duten pazienteen tratamendua eta mantentzea - B12 bitaminaren eskasiaren tratamendua, elikagai gutxi hartzeagatik Fitxa teknikorako esteka.
	Estriola	Ovestinon® 1 mg/g, baginako krema 15g. Ekarpen normaletik murriztura (zizeroa) aldatzea. Fitxa teknikorako esteka.
	Semaglutida	Rybelsus® 1,5, 4 y 9 mg, konp. Aurkezpen berriak, hurrenez hurren 3 mg, 7 mg eta 14 mg-ko aurkezpen "zaharren" dosi biobaliokideekin. Fitxa teknikorako esteka.

 Indikazioa, finantzaketa edo preskripziorako eta emateko baldintzak zabaltzea

 Merkaturatutako printzipio aktibo berria (edo lehendik dagoen bat administratzeko bide berria)

 Beste batzuk (etorkizuneko aldaketen jakinarazpenak barne)

2020ko urtariletik aurrerako berrikuntzak biltzen dituen [dokumenturako esteka](#).

9

MEDIKAMENTUEN HORNIDURA-GABEZIAK ETA - BERREZARPENAK


Hona hemen hilabete honetako HORNIDURA-GABEZIArik garrantzitsuenak:

- Mucosan retard® (anbroxola) 75 mg, 10 askapen luzeko kapsulak
- Penilevel® (bencilpenicilina) 5.000.000 UI eta 2.000.000 UI, bial 1
- Oftacilox® (ziprofloxazinoa) 3mg/g-ml, pomada oftalmikoa eta kolirioa
- Avaric® (fentaniloa) 533 mikrogramo, 30 mihipeko konprimituak
- Gonasi kit® (gonadotropina korionica) 5.000 UI hauts, bial 1
- Ibuprofeno Kern Pharma 200 mg granulatu eferbeszentea EFG, 20 zorro
- Isovorin® (azido lebofolinikoa) 5mg, 30 konp.
- Levotiroxina sodikoa Teva EFG 50 mikrogramo, 50 eta 84 konprimitu
- Urbason® (metilprednisolona) 4 mg, 10 konprimitu
- Metoject® eta Methofill® (metotrexatoa) 15 mg/0,30 ml, xiringa 1
- Tacforius® (tacrolimus) EFG 0,5 mg, 30 askapen luzeko kapsulak

HORNIDURA-BERREZARPENAK:

- Dolotren® (diklofenakoa) 75 mg disoluzio injektagarri, 3 ml-ko 6 anpoila
- Estradot® (estradiola) 75 mcg/24 h, 8 partxe
- Micetal® (flutrimazola) 10 mg/g, krema 60 g
- Cellpet® (mikofenolatoa) 1 g/5ml hautsa ahozko suspentsiorako, 175 ml
- Tirodril® (tiamazol) 5 mg eta 10 mg, 40 konprimitu

PRESBIDEn “Hornidura-gabezia” botoia eskuragarri dago, “Preskripzioen kontsulta” pantailaren beheko aldean, hornidura-gabeziei buruzko informazio erabilgarria erakusten duena.



Hornidura-gabeziak esteka honetan kontsulta daitezke:

- Presbiden: [Hornidura-gabezien taula](#)
- CIMA-AEMPSen: [AEMPSen medikamentuen hornidura arazoak](#)

Lehen Mailako Arretako Farmazia

Farmazialariak: Arantza Hernández, Javier Martínez, Inés San José eta María Prieto.

Iradokizunak edo iruzkinak egiteko, bidali posta elektronikoa helbide honetara:

ARABAKO ESI-A: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



Argitalpen honen edukia Osakidetza Lehen Mailako Arretako farmazialariek egindako hileroko buletinetik egokitu da FarmaHitzak buletinak Osakidetza intranetean daude eskuragarri hurrengo [estekaren](#) bidez.