



FARMACIA - OSI ARABA

Farmacia de Atención Primaria

[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Julio 2026

NOVEDADES PRESBIDE

- Duración envase predefinida para antibióticos de 20 sobres/comprimidos
- Cambio en desplegable de pautas

1

[Seguir leyendo](#)

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE SUSTITUCIÓN DE FIXAPROST UNIDOSIS POR DESABASTECIMIENTO

2

[Seguir leyendo](#)

VACUNACIÓN Y PROFILAXIS ANTE VIAJES AL EXTRANJERO

3

[Seguir leyendo](#)

PILOTO CANAL DE COMUNICACIÓN OFICINAS DE FARMACIA – ATENCIÓN PRIMARIA

4

[Seguir leyendo](#)

MATERIALES SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A TOPIRAMATO

5

[Seguir leyendo](#)

PUBLICACIONES DE INTERÉS

- INFAC: Heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux
- Ficha i-botika: MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA: ¡NO ES UN JUEGO! - Vitamina D: la dosis correcta es la clave.
- Guía AHA/ACC/ADA/ASN 2026 para la prevención, detección, evaluación y manejo del síndrome cardiovascular-renal-metabólico
- Riesgos asociados con el uso a largo plazo de benzodiazepinas en el insomnio crónico: una revisión sistemática y un meta-análisis (en red)

6

[Seguir leyendo](#)

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

7

[Seguir leyendo](#)

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

8

[Seguir leyendo](#)

PRESCRIPCIONES A USUARIOS QUE SE DESPLAZAN FUERA DE EUSKADI

9

[Seguir leyendo](#)

INYESPRIN® PRESENTACIÓN EXTRANJERA

10

[Seguir leyendo](#)

1 NOVEDADES PRESBIDE

Se ha publicado un nuevo boletín con [Novedades Presbide Junio 2026](#):

- **Duración envase predefinida para antibióticos de 20 sobres/comprimidos:** la AEMPS, en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), va a eliminar del mercado los formatos de mayor tamaño de algunos antibióticos con el fin optimizar el uso correcto de estos medicamentos y reducir las resistencias.
Por lo tanto, se ha actualizado Presbide para que la duración del envase de 20 comprimidos/sobres de Amoxicilina y Amoxicilina/ácido clavulánico sea, por defecto, de 7 días. Así, ante una prescripción de 3 tomas diarias durante 7 días, solo se podrá dispensar 1 envase de 20 dosis.
En general, se recomienda usar pautas cortas (7 días o menos). En pautas de 7 días/3 tomas al día, con un envase de 20 unidades es suficiente. La última unidad no es necesaria. [Díptico informativo](#)
- **Cambio en desplegable de pautas:** el contenido del desplegable “Pautas” se va a adaptar al medicamento que se quiera prescribir. Esta nueva funcionalidad permite excluir las pautas “inadecuadas” a nivel de presentación DOE/CODNAC para evitar seleccionarlás por error. Así, por ejemplo, no estarán disponibles en el desplegable las pautas diarias de los medicamentos con pauta semanal, mensual o trimestral.
Las prescripciones previamente activas siguen siendo dispensables, pero, en el momento que se tenga que renovar la prescripción, será necesario seleccionar la nueva pauta.

En la web también está disponible el resto de los [boletines](#) y [mejoras](#) publicadas.

[Volver a INICIO](#)

2 AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE SUSTITUCIÓN DE FIXAPROST UNIDOSIS POR DESABASTECIMIENTO

Según informa el Departamento de Salud, tras valorar el desabastecimiento del **FIXAPROST 50 MICROGRAMOS/ML + 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS, 30 envases unidosis de 0,2 ml** (CN: 723944), se autoriza la sustitución de las prescripciones del colirio en formato monodosi, por las presentaciones en frasco, tanto en receta electrónica como en papel, mientras dure esta situación o determine el Departamento.

La sustitución se hará teniendo en cuenta que tiene que ser el mismo principio activo, dosis y unidad de contenido.

[Volver a INICIO](#)

3 VACUNACIÓN Y PROFILAXIS ANTE VIAJES AL EXTRANJERO

Desde la Dirección de Salud Pública se ha emitido la siguiente [nota](#) en relación a la vacunación y profilaxis ante viajes al extranjero.

En ella se dice que la indicación de las vacunas y medicamentos preventivos ante viajes al extranjero corresponde a Sanidad Exterior y se realiza en los Centros de Vacunación Internacional de la Comunidad. Las vacunas y profilaxis indicadas por los Centros de Vacunación Internacional de la Comunidad deben ser administradas por los profesionales en los Centros de Salud de Osakidetza siguiendo sus recomendaciones.


Para las indicaciones no financiadas por el Departamento de Salud, Vacunación Internacional realizará una receta para que el usuario compre la vacuna en la farmacia. En el caso de que se trate de vacunas inyectables deben ser administradas por nuestros profesionales en los Centros de Salud de Osakidetza siguiendo sus recomendaciones.

[Volver a INICIO](#)

4

PILOTO CANAL DE COMUNICACIÓN OFICINAS DE FARMACIA – ATENCIÓN PRIMARIA

Se ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto del canal de comunicación oficinas de farmacia – Atención Primaria en el que se han incorporado nuevas UAP, además de incluirse alguna modificación en el procedimiento. El objetivo del proyecto es establecer un procedimiento de comunicación, para gestionar de forma ágil las incidencias que se dan en la práctica habitual de la oficina de farmacia y trasladar a profesionales de Osakidetza (Atención Primaria principalmente) aquellas observaciones que se consideren relevantes sobre el propio tratamiento o sobre otros aspectos del/la paciente.



OSI	UAP
OSI ARABA	Zaramaga, Montaña Alavesa , Valles I , Olárizu
OSI BARAKALDO-SESTAO	La Paz, Kueto
OSI BARRUALDE-GALDAKAO	Etxebarri, Arrigorriaga
OSI BIDASOA	Hondarribia, Dumboa , Irun Centro
OSI BILBAO-BASURTO	Mina del Morro, San Adrián
OSI DEBABARRENA	Elgoibar, Deba
OSI DEBAGOIENA	Bergara, Valle de Leniz
OSI DONOSTIALDEA	Zarautz–Orio–Aia, Gros
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES	Buenavista, Trápaga-La Arboleda
OSI GOIERRI-UROLA GARAIA	Lazkao, Azpeitia
OSI RIOJA ALAVESA	Rioja Alavesa
OSI TOLOSALDEA	Andoain, Ibarra
OSI URIBE	Alango, Mungia

Más información en la [intranet corporativa](#).

[Volver a INICIO](#)

5 MATERIALES SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A TOPIRAMATO

A continuación, se facilita el acceso a varios materiales sobre prevención de riesgos asociados a topiramato. El objetivo de estos materiales es ayudar a minimizar la posibilidad de aparición de algunos riesgos que se consideran relevantes por su gravedad, y aportar al paciente información para tal fin.

Las recomendaciones de manejo recogidas en estos materiales no han cambiado con respecto a la versión anterior, se redistribuyen como comunicación periódica con el objetivo de que los profesionales sanitarios se mantengan debidamente informados.

- [Guía de información para el profesional sanitario](#)
- [Guía de información para el paciente](#)
- [Formulario de conocimiento del riesgo del uso de topiramato para profesionales sanitarios](#)
- [Formulario de conocimiento del riesgo del uso de topiramato para pacientes](#)
- [Tarjeta de información para la paciente](#)

Estos materiales también están disponibles en la web de la AEMPS en el siguiente enlace: [Materiales sobre prevención de riesgos – web AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

6 PUBLICACIONES DE INTERÉS

INFAC: Heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux

Está disponible en la [web](#) el nuevo boletín INFAC titulado “**Heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux**”. El objetivo de este [boletín](#) es revisar la eficacia de las HBPM y fondaparinux en las indicaciones principales, su dosificación y consideraciones de seguridad.

Ficha i-botika: MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA: ¡NO ES UN JUEGO! - Vitamina D: la dosis correcta es la clave.

Se ha publicado una nueva ficha i-botika de información ciudadana sobre la “MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA: ¡NO ES UN JUEGO! – **Vitamina D: la dosis correcta es la clave**”, que incluye recomendaciones sobre cómo administrarla de forma segura.

Se puede consultar la ficha en el siguiente [enlace](#).

Adicionalmente, por parte del grupo de seguridad de la OSI se han elaborado unas Hojas informativas sobre la administración de VITAMINA D en diferentes idiomas (castellano, euskera, inglés, francés, árabe y urdu) disponibles en el siguiente enlace: [Araba ESI - OSI Araba](#)

Guía AHA/ACC/ADA/ASN 2026 para la prevención, detección, evaluación y manejo del síndrome cardiovascular-renal-metabólico

La [Guía 2026 de la AHA/ACC/ADA/ASN](#) sobre el síndrome cardiovascular-renal-metabólico actualiza y amplía la guía publicada en 2013 sobre el manejo del sobrepeso y la obesidad en adultos. Su objetivo principal es orientar a los profesionales sanitarios que atienden a personas con este síndrome. La guía explica cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo abordarlos de forma conjunta para mejorar la salud de los pacientes.

Riesgos asociados con el uso a largo plazo de benzodiacepinas en el insomnio crónico: una revisión sistemática y un meta-análisis (en red)

Esta [revisión](#) evalúa los riesgos de usar benzodiacepinas durante más de 3 meses en adultos con insomnio crónico. Los resultados sugieren que su uso prolongado puede empeorar la calidad del sueño, la salud mental y la calidad de vida.

Aunque la evidencia disponible es limitada, se recomienda evitar el uso prolongado de benzodiacepinas y priorizar intervenciones no farmacológicas y alternativas con mejor perfil de seguridad.

[Volver a INICIO](#)

7

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

No hay novedades en julio.

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

8

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- Royen® (635 mg Ca) (Acetato calcio) 2,5 g 30 y 60 sobres polvo para suspensión oral
- Atamax®, Atomoxetina Cinfa®, Atomoxetina Tarbis® (Atomoxetina hidrocloreto) 80 mg 28 cápsulas
- Iruxol mono® pomada (Clostridiopeptidasa / proteasas) 1 tubo 30 g
- Oralsone adultos® (Hidrocortisona hemisuccinato) 2,5 mg 12 comprimidos para chupar
- Fixaprost® (Latanoprost/Timolol) 50 microgramos/ml + 5 mg/ml colirio en solución 30 envases 0,2 ml
- Constella® (Linaclotida) 290 microgramos 28 capsulas
- Metsunix® (Metformina / Sitagliptina) 50 mg/500 mg 56 comprimidos liberación modificada
- Imigran® (Sumatriptan) 10 mg y 20 mg solución para pulverización nasal 2 envases unidosos

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- Ubtest®, Tau-kit® (13-urea) 100 mg 1 comp
- Royen® (acetato calcio) 500 mg 60 y 120 cápsulas duras
- Adisocol® (ácido ursodeoxicólico) 450 mg 60 comp
- Trankimazin retard® (alprazolam) 3 mg 30 comprimidos liberación prolongada
- Largactil® (clorpromazina) 100 mg comp recubiertos
- Cholestagel® (colesevelam) 625 mg 180 comprimidos recubiertos
- Doxiciclina Normon® 100 mg comprimidos recubiertos, 42 grageas
- Actiq® (fentanilo) 600 microgramos 30 comprimidos para chupar (con aplicador bucal)
- Micetal® (flutrimazol) 10 mg/g polvo cutáneo, 1 tarro de 30 g
- Uniket®, Mononitrato de isosorbida Normon® EFG (mononitrato de isosorbida) 40 mg 20 comprimidos
- Levotiroxina sódica Teva® 100 microgramos, 100 comprimidos
- Urbason® (metilprednisolona) 4 mg, 10 y 30 comprimidos
- Metoject® (metotrexato) 7,5 mg / 0,15 ml c/4 jeringa
- Metoject® (metotrexato) pen 17,5 mg 4 plumas precargadas solución inyectable 0,35 ml
- Manerix® (moclobemida) 150 mg 30 comp recubiertos
- Risperidona Viatris®, Cinfamed®, Stada® 0,5 mg 56 comp recubiertos
- Amchafibrin® (ácido tranexámico) 500 mg 30 comprimidos
- Depakine Crono® (valproato sodio, ácido valproico) 500 mg, 100 comp liberación prolongada
- Zolpidem Normon® 5 mg 30 comprimidos

- Hidroclorotizida Cinfa® (hidroclorotiazida) 12,5 mg 20 comp
- Psicotric retard® (quetiapina fumarato) 300 mg comp liberación prolongada, 60 comprimidos
- Dariante EFG®, Neupro® (rotigotina) 1 mg/24 h 28 parches transdérmicos 1,84 mg
- Neupro® (rotigotina) 3 mg/24 h 28 parches transdérmicos 6,75 mg

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones” con información útil sobre desabastecimientos:



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- En Presbide: [Tabla Desabastecimientos](#)
- En CIMA-AEMPS: [Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

9

PRESCRIPCIONES A USUARIOS QUE SE DESPLAZAN FUERA DE EUSKADI

Con el fin de aclarar dudas sobre la dispensación de las prescripciones para pacientes que se desplazan fuera de Euskadi en viajes de larga estancia, se recuerdan las instrucciones de Osakidetza de cómo proceder en Presbide - eRezeta para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

En general, se desaconseja usar el crédito adicional para estas situaciones, ya que su uso puede llevar a que los pacientes puedan consumir/acumular más medicación de la que necesitan.

VIAJE A OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Hay Interoperabilidad con todas las CCAA. Las personas aseguradas por el SNS pueden recoger su medicación en cualquier oficina de farmacia del Estado.

VIAJE A PAISES EXTRANJEROS CON INTEROPERABILIDAD

Existe interoperabilidad con diferentes países miembros de la UE, entre los que están: Portugal, Croacia, Polonia, Finlandia, Estonia, República Checa, Letonia, Grecia, Lituania, Chipre y Austria. La relación actualizada de países se puede visualizar en la página web del Departamento de Salud.

VIAJE A PAISES EXTRANJEROS SIN INTEROPERABILIDAD:

- En desplazamientos de menos de 1 mes: puede recoger la medicación en la oficina de farmacia antes de irse, si tiene crédito disponible.
- En desplazamientos de más de 1 mes: se pueden imprimir recetas hasta un máximo de 3 meses, que es la cantidad máxima que autoriza las AEMPS.

Como las recetas impresas desde Presbide tienen fechas sucesivas (p. ej. 22 julio / 19 ago /16 sep), para poder recoger esa medicación en la farmacia antes de ir al extranjero, el profesional de Osakidetza debe enmendar la fecha de las recetas impresas para que tengan la fecha actual. Si no, la farmacia no puede entregar la medicación. Para ello, el /la médico/a debe tachar la fecha que ha asignado Presbide a la receta y anotar la fecha actual. Escribir al lado: “Vale enmienda”, posteriormente firmar y sellar la receta.

Si la corrección la realiza un prescriptor diferente al que inicialmente prescribió la receta, este nuevo prescriptor deberá, además de su firma, anotar también sus datos (nombre, apellidos y número de colegiado), de forma que se pueda identificar quién hizo la corrección.

En el caso de recetas impresas con visado electrónico, la corrección corresponde realizarla al /la Inspector/a.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: [PRESBIDE Viajes Impresiones de recetas y dispensaciones](#)

[Volver a INICIO](#)

10

INYESPRIN® PRESENTACIÓN EXTRANJERA

El medicamento Inyesprin® con frecuencia presenta problemas de suministro, lo que obliga a tener que utilizar recurrentemente algunas presentaciones de medicamento extranjero.

Como ocurre con todas las marcas comerciales de AAS inyectable (incluido el inyesprin), los viales contienen 900 mg de acetilsalicilato de lisina, que son equivalentes a 500 mg de ácido acetilsalicílico. La diferencia es que, en función del laboratorio, deciden mostrar en el etiquetado el contenido en función del salicílico o de la sal.

La presentación que está disponible actualmente en el almacén de primaria es ASL (ACIDE ACETYLSALICYLIQUE) PANPHARMA (ver imagen).



[Volver a INICIO](#)

Servicio de Farmacia – OSI Araba

Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, María Prieto e Inés San José

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a alguna de las siguientes direcciones:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza. Los boletines FarmaHitzak están disponibles en la INTRANET de Osakidetza en el siguiente [enlace](#)