



MEDIKAMENTUAK ETA ERORTZEKO ARRISKUAK

Talde terapeutikoa	Medikamentuak	Eragindako ondorioak/efektuak	Egin beharrekoak
Antsiolitikoak eta hipnotikoak	Alprazolama, Bromazepama, Klorazepato dipotasikoa, Diazepama, Lorazepama, Lormetazepama, Triazolama, Zolpidema	Hipotentsio ortostatikoa (HO), kontzientzia-maila murriztea, narriadura kognitiboa eta psikomotorra, zorabioak, nahasmena.	- Dosia eten eta/edo doitu - Erretiratze mailakaturik eta gainbegiraturik egin (monitorizatu asaldura, insomnioa, antsietatea)
Antidepresiboak	Triziklikoak: Amitriptilina, Imipramina Beste batzuk: Mianserina, Mirtazapina, Trazodona ISRS: Zitaloprama, Benlafaxina, Duloxetina, Fluoxetina, Paroxetina	Logura, ikusmen lausoa, zorabioak, HO, idorreria, gernerretentzioa, hiponatremia.	- Indikazioa berrikusi eta, ahal bada, bertan behera utzi, pixkanaka eta gainbegiraturik - Eten ezin bada, murriztu dosia/maiztasuna
Antipsikotikoak	Klorpromazina, Haloperidola, Olanzapina, Ketiapina, Errisperidona	HO, nahasmena, mugimen-koordinazioa gutxitzea, oreka galtzea, efektu estrapiramidalak, zorabioa, ikusmen lausoa.	- Indikazioa berrikusi eta, ahal bada, bertan behera utzi, pixkanaka eta gainbegiraturik - Ezin bada eten, murriztu dosia/maiztasuna
Antikolinergikoak, maskurian eragiten dutenak	Fesoterodina, Solifenazina, Tolterodina	Zorabioak, ikusmen lausoa, gernerretentzioa, nahasmena, logura.	- Berrikusi indikazioa - Dosiak eta/edo farmakoen kopurua murriztu edo eten
Parkinsonaren aurkakoak	Entekapona, Pramipexola, Errasagilina, Erropirinola, Errotigotina	HO, nahasmena, zorabioa, eguneko logura, insomnioa, nahasmena.	- Tentsio arteriala kontrolatu - Posible bada, espezialistak sendagaia aldatuko du.
Analgesiko opiazeoak	Opiazeo eta deribatu guztiak: Kodeina, Fentaniloa, Morfina, Oxizodona, Tramadola	Logura, nahasmena, haluzinazioak, HO, moteltasun motela.	Berrikusi dosiak eta adierazi aldizka. Mina monitorizatu
Antiepileptikoak	Karbamazepina, Fenitoina, Fenobarbitala, Gabapentina, Lamotrigina, Lebetiracetama, Topiramatoa, Azido Balproikoa, Pregabalina	Ezegonkortasuna, ataxia, logura	- Baloratu indikazioa (minean erabili) - D bitaminaren balizko defizita monitorizatu
Antibertiginosoak	Zinarizina, flunarizina, sulpirida, metoklopramida	HO, sedazioa.	- Tratamendurik ez hasi - Eten, ez dago onuraren ebidentziarik tratamendu kronikoarekin
Antihistaminikoak	Dexklorfeniramina, Difenhidramina, Hidroxizina	Sedazioa.	Ez erabili. Lasaigarriak ez diren antihistaminikoak lehenetsi
Kardiobaskularrak	IECA/ARA II: Enalapril, Kaptopril, Erramipril, Kandesartana, Losartana, Baltsartana Diuretikoak: Amilorida, Klortalidona, Espironolaktona, Furosemida, Hidroklorotiazida, Indapamida, Betablokeatzaileak: Atenolola, Bisoprolola, Karbedilola, Nebivolola, Propranolola Alfablokeatzaileak: Doxazosina, Terazosina Hodi-dilatzaileak: Nitratoak + Sildenafiloa/Tadalafiloa/Bardenafiloa Antiarritmikoak: Digoxina, Amiodarona, Flekainida, Sotalola	Hipotentsioa, HO, zorabioak, nekea, logura, nahasmena Hiponatremia, hipokalemia Bradikardia, hipotentsioa, HO, sinkopea.	- Tentsio arterialaren kontrol erregularra - Indikazioa berrikusi eta, ahal bada, alternatiba seguruagoak erabili, batez ere alfablokeatzaileen kasuan. - Diuretikoaren erabilera murriztu edo bertan behera utzi, fluidoaren gainkargarik ez badago.
Alfablokeatzaileak hiperplasia prostatikorako	Silodosina, Tamsulosina, Alfuzosina	Zorabioa, hipotentsioa, HO	Kenduz gero, sintoma prostatikoak monitorizatu
Hipogluzemiatzaileak	Sulfonilureak: Glibenklamida, Glimepirida, Glikazida, Tolbutamida Intsulinak	Zorabioa, hipogluzemiagatik.	- Gluzemia-kontrola - Antidiabetikoa aldatzea