



FARMACIA - OSI ARABA

Farmacia de Atención Primaria

[e-mail: farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus](mailto:farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus)

Agosto 2026

NOTAS INFORMATIVAS DE LA AEMPS

- La EMA recomienda retirar la autorización de comercialización de Tavneos® (avacopan)

1

[Seguir leyendo](#)

PUBLICACIONES DE INTERÉS

- INFAC: Desetiquetado de alergia a la penicilina
- La SEFAP publica su 47º infografía sobre el magnesio
- Guía clínica para la retirada progresiva de benzodiacepinas
- Resultados cardiovasculares y renales de la terapia combinada con iSGLT2 y arGLP-1

2

[Seguir leyendo](#)

NOTAS INFORMATIVAS DEL ÁREA DE “ENFERMEDADES, VACUNAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA” DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

3

[Seguir leyendo](#)

NOTICIAS DE INTERÉS

- Cese de comercialización de Saxenda® (Liraglutida)
- Cese de comercialización de Insulina Novomix® 50

4

[Seguir leyendo](#)

PRESCRIPCIONES A USUARIOS QUE SE DESPLAZAN FUERA DE EUSKADI: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

5

[Seguir leyendo](#)

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

6

[Seguir leyendo](#)

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

7

[Seguir leyendo](#)

1

NOTAS INFORMATIVAS DE LA AEMPS

La EMA recomienda retirar la autorización de comercialización de Tavneos® (avacopan)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una [nota informativa](#) donde recomienda retirar la autorización de comercialización a Tavneos® (Avacopan) al considerar el comité de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) que la relación beneficio-riesgo ya no es favorable.

[Volver a INICIO](#)

INFAC: Desetiquetado de alergia a la penicilina

Está disponible en la [web](#) el nuevo boletín INFAC titulado **“Desetiquetado de alergia a la penicilina”**.

El objetivo de este [boletín](#) es concienciar a los profesionales sobre la importancia del etiquetado correcto de la alergia a penicilina, revisar las recomendaciones sobre el manejo de pacientes que refieren tener alergia a penicilina y proponer estrategias útiles que se puedan aplicar por los profesionales de los distintos ámbitos para proceder al desetiquetado seguro de las falsas alergias a penicilina.

Nueva infografía de la SEFAP: ¿Qué debes saber antes de tomar magnesio?

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha publicado una nueva infografía: ¿Qué debes saber antes de tomar magnesio? El magnesio es un mineral clave que actúa en muchas reacciones en todo el cuerpo. Una dieta sana te da el magnesio que necesitas y, si estás bien, no necesitas suplementos.

Material disponible en formato [PDF](#) o como [presentación interactiva](#).

Se puede acceder a estas y a otras infografías de la SEFAP en el siguiente [enlace](#).

Guía clínica para la retirada progresiva de benzodiacepinas de la Sociedad Americana de Medicina de familia

La revista *American Family Physician* (AFP) junto con representantes de diez sociedades científicas ha elaborado una [guía clínica](#) para la retirada progresiva de benzodiacepinas en adultos fuera de los cuidados paliativos y del final de la vida. En ella se recomienda un proceso gradual, individualizado y centrado en el paciente para minimizar riesgos graves, evitando la interrupción abrupta.

Se enfatiza la evaluación clínica continua, las intervenciones psicosociales y un enfoque especial en adultos mayores, usuarios de opioides, con problemas psiquiátricos o en situación de embarazo o lactancia. Debido a la limitada evidencia disponible, muchas de las recomendaciones se basan en el consenso de expertos (Volumen 113, nº6, Junio 2026).

Resultados cardiovasculares y renales de la terapia combinada con iSGLT-2 y arGLP-1 frente a cada tratamiento por separado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

La revista *Canadian Medical Association Journal* (CMAJ) ha publicado en julio de 2026 un [metanálisis](#) en red de 12 ensayos clínicos aleatorizados (ECA), que incluyeron a casi 100.000 pacientes con diabetes tipo 2.

El estudio comparó la efectividad y seguridad de la terapia combinada de iSGLT-2 y arGLP-1 frente a la monoterapia con cualquiera de estos fármacos o placebo.

Se incluyeron ECA de adultos mayores de 18 años con diabetes tipo 2 que recibieron arGLP-1, con o sin uso basal de iSGLT-2, y aquellos que recibieron iSGLT2 con o sin arGLP-1 inicial. Todos los ensayos incluidos evaluaron la monoterapia arGLP-1 o iSGLT-2 frente a placebo. Ningún ensayo comparó directamente la terapia combinada iSGLT-2 y arGLP-1 con placebo

En comparación con iSGLT-2 o arGLP1 por separado, la terapia combinada no redujo significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares o renales adversos graves, pero se asoció con menores riesgos de ingreso hospitalario relacionado con insuficiencia cardíaca.

Se necesitan ECA que comparen directamente la terapia combinada con la monoterapia para confirmar estos beneficios potenciales de la terapia combinada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

3

NOTAS INFORMATIVAS DEL ÁREA DE “ENFERMEDADES, VACUNAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA” DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

El Departamento de Salud, desde el área de “Enfermedades, vacunas y vigilancia epidemiológica”, ha introducido [nuevas recomendaciones](#) en la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en la temporada 26/27. La inmunización se desarrollará entre el 14 de septiembre de 2026 y 31 de marzo de 2027.

Así mismo ha emitido una [nota](#) para recordar la importancia del refuerzo de captación de población diana de VCN20. Además, se han actualizado los siguientes capítulos y anexos del [Manual de Vacunaciones e Inmunizaciones](#):

- 2.3.- Control de cadena de frío y almacenamiento de vacunas
- 4.16.- Mpox
- 11.3.- Hoja de incidencias de vacunas
- 11.4.- Cuadro de termoestabilidad de productos inmunizantes
- 11.11.- Adaptación calendario en pediatría
- 11.12.- Adaptación calendario en personas adultas

Para más información, consultar:

[Información sobre vacunas orientada a profesionales de la salud - Enfermedades, vacunas y vigilancia epidemiológica - Departamento de Salud - Gobierno Vasco - Euskadi.eus](#)

[Volver a INICIO](#)

4

NOTICIAS DE INTERÉS

Cese de comercialización de Saxenda® (Liraglutida), 5 plumas precargadas de 3 ml

Novo Nordisk Pharma S.A. ha notificado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que, con fecha 1 de septiembre de 2026, se procederá al cese de comercialización en España de la siguiente presentación de Saxenda® (Liraglutida):

- SAXENDA® 6 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE en PLUMA PRECARGADA, 5 plumas precargadas de 3 ml

La presentación de 5 plumas tendrá aviso en Presbide: “Cese de comercialización de SAXENDA® 6 mg/ml, 5 plumas (Liraglutida) el 1 de septiembre de 2026. Valorar cambio a otro tratamiento.”

Este cambio no implica la retirada de Saxenda® del mercado, ya que continuará disponible la presentación de 3 plumas precargadas de 3 ml (CN 724999.3), a pesar de que en este momento se encuentre en desabastecimiento. Asimismo, se recuerda que Saxenda® no está financiado por el Sistema Nacional de Salud y que su dispensación se realiza mediante receta médica a través de oficinas de farmacia.

Cese de comercialización de insulina Novomix 50®

En relación con [comunicaciones anteriores](#) de la AEMPS acerca del cese de comunicación de insulinas, se actualiza la siguiente información.

El laboratorio Novo-Nordisk ha confirmado la discontinuación de la comercialización de la insulina NovoMix 50® FlexPen® (insulina asparta bifásica) el 14 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, ninguna otra presentación del producto de NovoMix 50® estará disponible en el mercado.

Como alternativas terapéuticas a esta presentación de insulina que ha dejado de comercializarse, se plantean las siguientes opciones:

- [Mezcla de análogos de insulina](#):

- Humalog Mix® 50 Kwikpen® 100 U/ml. Código Nacional: 661147

Principios activos: Insulina Lispro 50 U/ml, Insulina Lispro Protamina 50 U/ml

- Régimen de insulina basal-bolo:
 - Insulina humana NPH de acción intermedia (humulina NPH 100U/ml) + bolo de análogo de insulina de acción rápida (asparta, lispro, glulisina, o fast aspart).
 - Análogo de insulina basal de acción prolongada (degludec, insulina glargina U100 o biosimilares de glargina U100 o glargina U300) + bolo de análogo de insulina de acción rápida (asparta, lispro, glulisina, o fast aspart).

[Volver a INICIO](#)

5

PRESCRIPCIONES A USUARIOS QUE SE DESPLAZAN FUERA DE EUSKADI: ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En el [número anterior del boletín Farmahitzak](#) se recordaban las instrucciones de Osakidetza de cómo proceder en Presbide - eRezeta para garantizar la continuidad de los tratamientos a los pacientes que se desplazan fuera de Euskadi.

Ahora se actualiza la información en los casos de **viaje a países extranjeros sin interoperabilidad de más de 1 mes de duración en lo relativo a la corrección de recetas impresas con visado electrónico** para un máximo de 3 meses de tratamiento. En este caso, el profesional médico podrá corregir la fecha de prescripción y, como en el caso de las recetas ordinarias, deberá escribir al lado: “*Vale enmienda*”, firmar y sellar la receta. Si la corrección la realiza un prescriptor/a diferente al que inicialmente prescribió la receta, este nuevo prescriptor/a deberá, además de su firma, anotar también sus datos (*nombre, apellidos y número de colegiado/a*), de forma que se pueda identificar quién hizo la corrección.

De esta manera, la corrección ya no corresponde realizarla a la Inspección Médica.

[Volver a INICIO](#)

6

NOVEDADES MENSUALES EN LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN RECETA

Estas son las novedades de agosto:

Agosto 2026		
	Clobetasol	Eleus® 0,5 mg/ml, 30 envases unidos de 0,2 ml colirio en emulsión. Indicación financiada para: • tratamiento de la inflamación asociada a la cirugía de cataratas en adultos Enlace a Ficha Técnica
	Salbutamol	Ventoaldo® 100 mcg/dosis suspensión para inhalación en envase a presión (con indicador de dosis). Indicación financiada para: • tratamiento sintomático del broncoespasmo en el asma bronquial y en otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias. • profilaxis de broncoespasmo inducido por ejercicio físico o antes de exponerse a un estímulo alérgico conocido e inevitable. Enlace a Ficha técnica
€	Piroxicam	Feldene® Flas 20 mg, liofilizados orales. Se suspende su comercialización. Enlace a Ficha técnica
	Ceftriaxona	Ceftriaxona EFG 250 mg, 500 mg y 1 G (polvo + solución). Se suprime la necesidad de visado. Enlace a Ficha técnica

■ Nuevo principio activo comercializado (o nueva vía de administración de uno existente); ■ Ampliación de indicación, financiación o condiciones de prescripción y dispensación; € Cese de financiación o suspensión de comercialización.

Enlace al [documento](#) que recoge las novedades desde enero 2020.

[Volver a INICIO](#)

7

DESABASTECIMIENTOS Y RESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

DESABASTECIMIENTOS más relevantes de este mes:

- **Farmaproina® 1.200.000 UI**, 1 vial + 1 ampolla (bencilpenicilina procaína)
- **Carnicor®** 100 mg/ml, 10 viales bebibles solución oral 10 ml (carnitina)
- **Arteoptic®** 2%, colirio 3 ml (carteolol)
- **Ekistol®** y **Cilostazol Aristo EFG** 50 mg, 56 comprimidos (cilostazol)
- **Somazina®** 1 g, 10 ampollas de 4 ml (citicolina)
- **Hidroquinidina Serecor** 300 mg, 60 cápsulas liberación prolongada (hidroquinidina hidrocloreto)
- **Imbarix®** 10 mg/1,5 mg, 30 comprimidos lib. modificada (indapamida/ramipril)
- **Vimpat®** y **Laprysta EFG** 10 mg/ml, jarabe 200 ml (lacosamida)
- **Latanoprost/timolol Stada** 50 mcg/ml+5 mg/ml, colirio en solución 2,5 ml (latanoprost/timolol)
- **Progevera®** 10 mg, 30 comprimidos (medroxiprogesterona acetato)
- **Methofill® Pen** 7,5 mg/0,15 ml, 4 plumas precargadas (metotrexato)
- **Methofill® Pen** 17,5 mg, 4 plumas precargadas solución inyectable 0,35 ml (metotrexato)
- **Efferalgan®** 500 mg, 24 cápsulas (paracetamol)
- **Procaína Serra®** 10 mg/ml, ampollas de 5 y 10 ml (procaína hidrocloreto)
- **Bijuva®** 1/100 mg, 28 y 84 cápsulas (progesterona/estradiol)
- **Xarelto®** 1 mg/ml granulado para suspensión oral, frasco de 2,625 g y 5,25 g (rivaroxabán)
- **Sulfadiazina Reig Jofre®** 500 mg, 20 comprimidos (sulfadiazina)
- **Soltrim®** 160 mg/800 mg, 5 viales polvo + 5 ampollas disolvente (trimetoprim/sulfametoxazol)

RESTABLECIMIENTOS de suministro:

- **Fluticasona Cipla** 125 mcg/inhalación suspensión, envase a presión 120 pulsaciones (fluticasona propionato)
- **Levotiroxina Teva EFG** 50 mcg 50, 84 y 100 comprimidos (levotiroxina)
- **Eutirox®** 50 mcg, 100 comprimidos (levotiroxina)
- **Levotiroxina Aristo EFG** 50 mcg, 100 comprimidos (levotiroxina)
- **Diproderm®** 0,05 %, pomada 30 g (betametasona dipropionato)
- **Periactin®** 4mg, 30 comprimidos (ciproheptadina)
- **Metobject® Pen** 17,5 mg, 1 pluma precargada 0,35 ml (metotrexato)
- **Methofill® Pen** 20 mg, 4 plumas precargadas 0,4 ml (manual) (metotrexato)
- **Effentora®** 100 mcg, 28 comprimidos bucales (fentanilo)
- **Effentora®** 200 mcg, comprimidos bucales, 4 y 28 comprimidos (fentanilo)
- **Fentanilo Aristo EFG** 100, 200 y 600 mcg, 28 comprimidos bucales (fentanilo)
- **Conferoport®** 0,5 mg, 30 cápsulas duras de liberación prolongada (tacrolimus)
- **Jorveza®** 1 mg, 60 comprimidos bucodispersables (budesonida)
- **Imigran®** 20 mg solución para pulverización nasal, 2 envases unidos (sumatriptán)
- **Obgemsa®** 75 mg, 30 comprimidos recubiertos (vibegron)

Se recuerda que está disponible en PRESBIDE el botón “Desabastecimientos”, ubicado en la zona inferior de la pantalla “Consulta de Prescripciones”, con información útil sobre desabastecimientos:



Los desabastecimientos de medicamentos pueden consultarse en:

- En Presbide: [Tabla Desabastecimientos](#)

En CIMA-AEMPS: [Acceso a Problemas de suministro de medicamentos de la AEMPS](#)

[Volver a INICIO](#)

Servicio de Farmacia – OSI Araba

Farmacéuticos de Atención Primaria: Arantza Hernández, Javier Martínez, María Prieto e Inés San José

Para sugerencias o comentarios, enviar correo electrónico a alguna de las siguientes direcciones:

farmacia.primariaosiaraba@osakidetza.eus



El contenido de esta publicación se ha adaptado del boletín mensual elaborado por las Farmacéuticas de Atención Primaria de Osakidetza

Los boletines FarmaHitzak están disponibles en la INTRANET de Osakidetza en el siguiente [enlace](#)